

Andalousie.

Cette espèce, excessivement voisine du *C. candidatus* de Sibérie, en diffère par sa taille plus petite, le rostre non gibbeux à l'extrémité et les élytres presque striées : le dessin du corselet est le même ; les taches des élytres sont bien plus petites, et en outre la teinte ferrugineuse ne se retrouve pas chez le *candidatus*. Quand l'insecte n'est pas très frais, la teinte ferrugineuse disparaît, et l'on ne voit plus que les taches blanches sur un fond d'un brun noirâtre.

SAPHANUS CYLINDRACEUS.

Long. 16 mill.

*Brunneo-niger, convexus, elongatus, flavopubescens, punctatissimus, prothorace convexo, lateribus dente minuto instructis, non spinosis, linea media lævi, scutello tenuiter punctato, pubescente; elytris elongatis, apice rotundatis, punctatis, subrugulosis.*

Allongé, convexe, d'un brun noir peu brillant, couvert d'une pubescence jaune, soyeuse, courte, peu serrée. Tête rugueusement ponctuée, un sillon peu enfoncé entre les antennes ; celles-ci courtes, ne devant pas dépasser la moitié du corps (il manque trois articles) : corselet convexe, un peu rétréci en arrière, arrondi sur les côtés antérieurement ; au milieu, de chaque côté, une très petite dent mousse ; surface très densément ponctuée : au milieu, une ligne lisse n'atteignant pas le bord antérieur. Ecusson demi-circulaire, très finement ponctué. Elytres ayant en longueur deux fois et demie celle du corselet et de la tête réunis : épaules arrondies, bords presque droits ; assez brusquement arrondies à l'extrémité où elles sont un peu plus larges qu'à la base ; couvertes de fines aspé-

rités comme celles d'une râpe, diminuant vers l'extrémité. Dessous du corps et pattes de même couleur que le dessus, mais plus ternes et couverts d'une pubescence grisâtre.

Espagne septentrionale.

Un seul individu ♂ dans la collection de M. Deyrolle.

Ce *Saphanus* diffère du *spinosis* par sa forme presque cylindrique, sa pubescence jaune, l'absence d'épine au corselet et le sillon de la tête peu marqué.