

Ein neuer *Liopus* aus dem Kaukasus.

Von Ludwig Ganglbauer.

Liopus caucasicus n. sp.

Von *Liopus nebulosus* L. durch längere und schmalere Flügeldecken, viel grössere und flachere untere Partie der Augen und in Folge dessen kürzere und breitere Wangen und durch andere Tomentirung verschieden. Das Grundtoment ist hell gelblichgrau, auf den Flügeldecken ist eine vorn ganz verloschene, hinten etwas deutlicher begrenzte Querbinde heller weissgrau. Die Breite dieser Binde erstreckt sich etwa vom ersten Drittel bis über die Hälfte der Flügeldeckenlänge. Auf jeder Flügeldecke sind fünf auf gelblichgrauem Grunde heller erscheinende Längsstreifen durch kleine schwarze Flecken unterbrochen. Der erste dieser Längsstreifen befindet sich an der Naht. Ausserdem sind die Flügeldecken durch einige unbestimmte hellere und dunkle Makeln, besonders auf der hinteren Hälfte, etwas scheckig. Das Toment der Unterseite und Beine ist weissgrau mit einem Stich ins Gelbliche; die Wurzel der Schenkel und der grössere Theil der Schienen röthlich durchscheinend; die Tarsenglieder an der Spitze schwarz. Halsschild und Flügeldecken wie bei *L. nebulosus* punktirt. Long. 9,5 mm.

Von Dr. G. Sievers wurde ein ♀ bei Tiflis gefunden.