

Planches.

42.

ticle jaune, les autres noirs, annelés de jaune à la base, tandis que dans la femelle ces antennes sont entièrement noires.

L'*Allocerus dilaticornis* de M. Gory (Ann. Soc. Ent. de France, t. 1, p. 384, pl. 12 B, f. 1) provient de Cayenne. C'est une magnifique espèce.

Le genre *Polyarthron* de M. Serville, formé avec le *Prionus pectinicornis* de Fabricius, s'est enrichi d'une deuxième espèce fort curieuse dont nous trouvons une femelle dans la belle collection de M. Buquet.

*Polyarthron ægyptiacum*, semblable pour la forme à la femelle de l'espèce type et en différant par son corps jaune, avec l'extrémité des mandibules, les yeux et les genoux noirâtres, et surtout par ses antennes, composées seulement de seize articles, tandis qu'il y en a trente-cinq ou trente-six chez l'autre espèce.— Long. 37, l. 11 1/2 mill.—Égypte.

M. Buquet a fait connaître deux genres nouveaux de Prioniens sous les noms de *Stiphilus* et *Mecosarthron* dans la Revue zool., 1840, p. 172, et dans le Magasin de Zoologie.

Voici quelques belles espèces inédites de Prioniens appartenant à divers genres de M. Serville.

*Pyrodes columbinus*. Corps rugueux en dessus, lisse dessous, d'un vert bleu, avec les antennes, les élytres et les pattes d'un bleu plus pur. Il se distingue du *P. speciosus* par sa forme plus allongée, plus aplatie et par ses élytres à côtés parallèles, n'offrant pas la dilatation arrondie qu'on voit à la base de celles de l'autre espèce. — Long. 26, l. 11 mill. — Cayenne. Collect. de M. Buquet.

*Mallaspis leucaspis*. Assez semblable au *Mall. scutellaris* d'Olivier, comme lui d'une couleur bronzée, mais plus vive, à reflets rouges sur les élytres. Notre espèce se distingue par son corselet presque lisse ou très-finement ponctué, et surtout par ses antennes bleues, dont les cinq derniers articles sont fauves (femelle).—Long. 40, l. 16 mill.—Cayenne. Coll. Buquet.

*Mallaspis xanthaspis*. Semblable au précédent pour la forme; d'un vert un peu bronzé. Corselet fortement rugueux. Duvet de l'écusson d'un bel orangé vif. Élytres finement rugueuses. Antennes bleues, pattes et dessous du corps d'un vert bleuâtre foncé. On connaît des variétés d'un brun rougeâtre. — Long. 40, l. 17 mill.—Colombie. Coll. Buquet.

M. Buquet possède trois espèces du genre que M. Serville a