

Mouff. ins. 133. *f. ultima.* *Frisch. ins.* 13. *t.* II.
Raj. ins. 31. *n.* 17.
Habitat in Europa:

- alpinus. 23. *C. thorace spinoso, coleoptris obtusis fascia maculisque quatuor atris, antennis longis.*
It. scan. 260. *Cerambyx subcærulefcens, fascia maculisque 4 nigris.*
Fonst. ins. t. 15. *f.* 3. *Rob. ic.* 8.
Scheuch. itin. 1. *t.* I. *f.* 5.
Habitat in Helvetia.
- ædilis. 24. *C. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis.*
Fn. svec. 479. *It. æl.* 8. *Cerambyx nebulosus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.*
Pet. gaz. t. 8. *f.* 8. *Capricornus rufficus.*
Mouff. ins. 151. *f.* 2. *Frisch. ins.* 13. *t.* 12.
Habitat in truncis arborum Europæ.
- futor. 25. *C. thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello pallido, antennis longissimis.*
Fn. svec. 482. *Cerambyx ater, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus; thorace spinoso.*
Gadd. diff. 27. *Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco æneis.*
Habitat in Europa.
- cerdo. 26. *C. thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.*
Habitat in Italia. M. Kæbler. in Germania. Forskåhl.
Statura præcedentis; corpus & artus nigra. Elytra apice pallidiora s. picea. Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis.
- textor. 27. *C. thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, antennis mediocribus.*
Uddm. diff. n. 29. *Cerambyx fordide niger, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.*
Habitat in Europa.