

*truncata, unidentata, antice echinato-muricata, lateribus nigra cum lineola, postice quasi fascia elytra secante. Antennæ corpore vix duplo longiores.*

lamed. 16. *C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis, fascia obscura longitudinali flexuosa, antennis brevioribus.*

*Fn. suec. 498. Leptura nigra, elytris nigricante lividoque variis.*

*Habitat in Europa.*

nebulosus. 17. *C. thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciisque nigris, antennis corpore longioribus. Fn. suec. 483. It. gotl. 273.*

*Habitat in Abietum truncis.*

hispidus. 18. *C. thorace spinoso, elytris subpræmorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.*

*Fn. suec. 484. t. 1. Cerambyx cinereus, elytris præmorsis nigris fasciaque alba, antennis sesquilongioribus.*

*Habitat in Europa.*

desertus. 19. *C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albo fasciatis, antennis longioribus. M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Thorax lineis 5 albis, quarum laterales sub thoracis margine sunt.*

succinctus. 20. *C. thorace bispinoso rugoso, elytris fastigiatis fascia flavâ, antennis longioribus compressis. M. L. U.*

*Habitat in America.*

virens. 21. *C. thorace spinoso, elytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. M. L. U.*

*Sloan. jam. 2. . . t. 237. f. 39. 40.*

*Brown. jam. 430. t. 43. f. 8.*

*Habitat in India.*

moschatus. 22. *C. thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.*

*Fn. suec. 478. Cerambyx viridi cærulescens, antennis corpus subæquantibus.*