

recueillies avec tant de succès et je suis heureux de pouvoir offrir à la Société entomologique de France le résultat des recherches de notre collègue.

Liste des espèces.

1. SPONDYLIS BUPRESTOIDES L.

2. MACROTOMA SCUTELLARIS Germ. (PRINOBIUS MYARDI Muls.).

3. RHESUS SERRICOLLIS Mots.

4. RHESUS ? GAILLARDOTI Chev.

5. RHAGIUM MORDAX F. (SYCOPHANTA Sch.), var. SYRIACUM. — Bande claire des élytres passant à une teinte rougeâtre fondue dans sa partie postérieure avec le reste des dessins.

6. TOXOTUS ? INSITIVUS, var. **latus**. — Grand et large ; tout le corps revêtu d'un duvet jaune ou cendré sur fond testacé ou rougeâtre, avec le prothorax et la tête noirâtres. Antennes et pattes d'un jaune ou rouge testacé, moins les genoux qui sont plus ou moins noirs. Prothorax assez long et étroit, avec une épine courte et des sillons (médian et postérieur) profonds. Élytres larges aux épaules, fortement impressionnés, puis assez diminués à l'extrémité, qui est obliquement échancrée, très revêtus de duvet fin et couché. Antennes robustes, 1^{er}, 3^e, 5^e articles moins longs que le 4^e. — ♂, ♀. Long. 14—17 mill. ; largeur aux épaules 6—8 mill.

7. ANISORUS HETERO CERUS Gangl.

8. BRACHYTA DELAGRANGEI Pic (L'Échange, n° 82), coll. C. Delagrange ; à placer en tête du groupe des *Brachyta* Fairm.

9. ACMÆOPS (LINOPTERA) COLLARIS L.

10. CORTODERA DISCOLOR Fairm.

11. C. id., var. RUBRIPENNIS Pic (L'Échange, n° 82).

La variété semble moins rare que le type ; elle devrait assez vraisemblablement constituer la forme normale.

12. CORTODERA SEMILIVIDA Pic (Ann. Soc. ent. Fr., 1891, Bull., p. cxiii). — Voisin de *Cortodera humeralis*, var. *suturalis* Fabr., il a quelques rapports aussi avec *C. pumila* Gangl., mais il est moins étroit, les épaules sont plus fortement impressionnées, etc.