

Brachyta borealis Gylh. var. *brunneonotata*. Noir avec les antennes et les pattes en partie roussâtres, les élytres d'un testacé roux ornés chacun de deux macules isolées brunâtres, l'une vers le milieu, l'autre après, ces deux macules n'atteignant ni la suture ni le bord externe. La Sibérie (coll. Pic).
A placer près de la v. *picta* Mœklin.

Brachyta borealis Gylh. var. *lateobscura*. Coloration noire très étendue. Antennes et pattes foncées, élytres noirs ornés chacun de 3 macules jaunes isolées, la première à peu près vers le milieu, la 3^e avant l'extrémité ; toute la partie antérieure élytrale foncée, quelquefois avec une macule roussâtre peu distincte située près de la suture.

Leptura (Pachytodes) erratica D. v. *Rosinæ*. Elytres presque entièrement testacés, peu distinctement maculés de brun antérieurement.

Anatolie : Ak-Chehir (M^{me} R. Korb, in coll. Pic).

Tetropium Staudingeri. Très grand, subparallèle, peu brillant, entièrement noir, revêtu d'une pubescence jaunâtre fine et couchée avec, sur l'avant-corps, quelques poils clairs redressés. Tête petite, creusée sur le vertex, grossièrement ponctuée ; antennes atteignant à peu près le milieu du corps, amincies à l'extrémité, 2^e article un peu plus court que le 3^e ; prothorax presque aussi large que long, modérément arrondi sur les côtés, sillonné sur le disque et muni d'une petite ligne brillante, peu grossièrement et irrégulièrement ponctuée, bord antérieur distinctement frangé de poils jaunâtres ; écusson un peu plus long que large, subarqué au sommet, sillonné au milieu ; élytres noirs, longs, subparallèles, à côtes indistinctes et ponctuation dense et fine ; dessous du corps et pattes foncés. Long. 17 mill. M^{ts} Alexandre (coll. Pic). — Dédié à la mémoire du très regretté et célèbre D^r Staudinger qui m'a procuré anciennement cette espèce, ainsi que plusieurs autres intéressantes.

T. Staudingeri a quelques rapports avec *fuscum* F., sa forme est plus allongée, son prothorax plus transversal, etc. Comparé à un exemplaire typique de *gracilicorne* Reitt., *Staudingeri* paraît en différer par la sculpture du prothorax, la forme du corps moins étroite, les élytres encore plus longs.

Purpuricenus dalmatinus Sturm. v. *biinterrupta*. Dessin postérieur noir des élytres normal mais l'intérieur décomposé en trois macules : une grande semicirculaire médiane et une petite latérale de chaque côté.

Grèce (coll. Pic).

Clytus floralis L., var. *araratensis*. Subparallèle, assez allongé, noir,