

L'Échange, Revue Linnéenne

Un Anaglyptus nouveau de Grèce

Anaglyptus luteofasciatus. — Allongé, entièrement noir, membres compris, peu brillant pubescent de gris, plus densément sur la partie apicale et la suture des élytres avec ces organes ornés de trois bandes faites de pubescence jaune ; prothorax moyen, nettement plus long que large ; antennes très pubescentes de gris avec le sommet des articles ordinairement foncé, un peu plus longues chez ♂, faiblement dentées au sommet interne de leurs 3^e et 4^e articles ; élytres faiblement impressionnés vers les épaules, modérément atténués à l'extrémité, obliquement tronqués au sommet, presque glabres et un peu brillants sur la base et la majeure partie du disque, assez densément pubescents de gris au sommet et sur la suture, ornés chacun de 3 fascies jaunes, la première, éloignée de la base, oblique antérieurement puis arquée, interrompue ou oblitérée en arrière, 2^e courte, un peu oblique, 3^e étroite, presque droite vers la suture et inclinée en arrière sur les côtés, cette dernière placée un peu en dessous du milieu des élytres ; dessous du corps pubescent de gris avec les côtés de la poitrine et de l'abdomen tachés de jaune. Long. 12 mill. Morée : environs de Kalavryta (coll. Pic).

Avec ses bandes jaunes élytrales cette intéressante nouveauté est des plus tranchées ; elle peut se placer dans le voisinage de *mysticus* L.

M. Pic.

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES D'ALGÉRIE & D'ASIE OCCIDENTALE

Adoretus Millingeni. — Assés robuste, modérément convexe, brillant, testacé avec la partie postérieure de la tête rembrunie, orné d'une pubescence assez longue et espacée, pas plus serrée sur les côtés des élytres ; clypeus faiblement subarqué et relevé, à ponctuation irrégulière ; tête à ponctuation irrégulière, granuleuse, à carène peu marquée et presque droite placée en avant du front, yeux grands ; prothorax court et large, sinué à la base, un peu arqué sur les côtés, à ponctuation forte et assez rapprochée ; écusson subtriangulaire, un peu ponctué ; élytres assez courts, à peine plus larges que le prothorax, peu élargis vers le milieu, assez fortement et irrégulièrement ponctués avec des traces de côtes ou stries, angle sutural arrondi, épipleures courts ; dent médiane des tibias antérieurs pas plus rapprochée de la dent apicale que de la supérieure, celles-ci très saillantes, tarsi ayant la grande dent des crochets bidentée au sommet. Long. 10 mill. Arabie (coll. Pic). — Rappelle *clypeatus* Brm. mais pubescence élytrale espacée sur le bord des élytres et carène frontale plus droite ou peu marquée.

Cebrio xanthoderes F. v. **Vaulogeri.** — Assez robuste et allongé, entièrement testacé-roussâtre sauf la tête et les élytres qui sont noirs, écusson testacé au milieu, obscurci sur les côtés, prothorax à angles postérieurs saillants et longs. Long.