

*titiis lævibus transversim subrugatis. Subtus abdomine punctato-rugato, tarsis infra fulvo hirtis ac spongiosis.*

*Hab. in Kabylia Algeriæ; a Dom. E. Chapelier lectus.*

Cette espèce, voisine du *H. afer*, lui ressemble tellement, qu'on la prendrait pour une variété bronzée de cette espèce, mais indépendamment de cette couleur, les angles postérieurs du corselet réfléchis, l'en distinguent suffisamment.

La femelle est plus grande et encore moins brillante que le mâle.

Je profite de l'occasion que m'offre la description de cet *Helops*, pour faire connaître que j'ai reçu un mâle de l'*Helops tuberculiger* Reiche (Ann. Soc. Ent. 1857, p. 265), dont je ne connaissais, lors de sa description, qu'une femelle; ce mâle a le sommet des élytres fortement prolongé en queue, pour le reste, il ne diffère nullement de la femelle.

6. URODON TESTACEIPES Reiche. — Longit. 2 3/4 mill., latit. 1 1/4 mill. — *Ovatus, fuscus, indumento subcervino vestitus; antennarum basi, ore pedibusque testaceis. Urod. rufipedi simillimus. Caput deflexum, paulo convexum, pube grisescenti depressa dense vestitum; rostro rectè truncato; oculis nigris parum prominulis; antennis thoracis basi attingentibus, testaceis, articulis tribus ultimis nigris. Thorax capite basi duplo latior, antrorsum angustatus sinuatusque, medio parum rotundatus, basi medio angulatim productus, angulis lateralibus acutis parum prominulis; pube cervina depressa, ad angulos posteriores albicanti, vestitus. Scutellum demersum. Elytra thorace paulo latiora et dimidio longiora, basi conjunctim valdè emarginata apice singulatim rotundata, supra modice convexa, pube cervina basi, a latere et in sutura albicanti vestita. Pygidium conicum, canaliculatum, cervino tomentosum. Subtus griseo-cervino tomentosus; pedibus testaceis; abdomine apice integro ♀.*

*Hab. in Kabylia Algeriæ. Inv. Dom. E. Chapelier.*

Cette espèce a la taille de l'*Urodon rufipes* Fab., elle en diffère par sa forme plus allongée, son corselet anguleux au milieu de la base, la masse de ses antennes noires, ses pattes entièrement testacées et la couleur de la tomentosité qui la revêt.

7. ANOPLISTES OBLONGO-MACULATUM. — Syn. *Callidiu moblongo-maculatum* Guérin. — Var. *Sexmaculatum* Icon. du Reg. An. Texte, p. 234.

Cet insecte est une des trouvailles les plus intéressantes qu'ait faites en Kabylie orientale M. l'abbé E. Chapelier, attaché à la colonne expéditionnaire envoyée l'année passée dans cette contrée, par le gouverneur de l'Algérie. Mais ce qui surtout la rend très curieuse, c'est que l'individu qu'il a bien voulu m'envoyer, offre sur les élytres une tache noire posté-

rieure qui manque dans le type décrit par M. Guérin. Comme il n'y a que cette seule différence, il est hors de doute que ce ne soit la même espèce.

L'examen des cavités cotyloïdes des pattes antérieures qui sont arrondies et non prolongées en dehors, ne permet pas de laisser cette espèce dans le genre *Callidium* et désigne sa place parmi les Purpuricénides et dans le genre *Anoplites*.

L'habitat de cette espèce est très étendu, M. Guérin l'a décrit comme venant de Grèce et je l'ai reçue par M. Truqui de l'île de Chypre.

8. LEMA PURPURICOLLIS Reiche. — Longit. 4 mill., latit. 2 mill. — *Oblonga, nigro cyanea; thorace rubro purpureo, clytris cyaneis; nitida, Lemæ melanopæ Linné affinis. Caput breve, inter oculos rugulosum et transversim impressum, vertice sulcatum; oculis valde prominulis, vix emarginatis; antennis dimidio corporis vix longitudine, validis. Thorax capitatis latitudine, longitudine medio paulo latior, valde convexus postice constrictus, a latere rotundatus, disco vage punctato; punctis valde impressis; nigro longitudinaliter subbifasciato. Scutellum quadratum, nigrum. Elytra thorace duplo latiora, elongata, parallela, infra basin transversim impressa, crenato striata, transversim subrugata; interstitiis lævibus. Subtus tomentosa; pectore punctulato.*

*Hab. in Kabylia, Algeriæ, Invenit. Dom. E. Chapelier.*

Cette espèce, extrêmement voisine de la *Lema melanopa* Linné, en diffère par ses antennes encore plus renflées, son corselet plus convexe, à ponctuation beaucoup plus forte, ses élytres à stries plus fortement ponctuées et crénelées, et dont les crénelures, en se réunissant, forment presque des rides transversales, enfin par ses pattes entièrement d'un noir bleuâtre.