

Descr. Niger. Elytra abdomenque sordide nigra; thorax globoso depresso, nitens; pedes testacei.

Letus sub finem Maji Viennae in Roslau, adeoque forte advena cum lignis Passaviebus aut Bavariis eo advectus.

279. VARIABILIS, Wandelbarer Bockläser.

Cerambyx variabilis, thorace mutico subrotundo inaequali glabro, pectore anoque ferrugineo, antennis mediocribus. *Lin.* *S. N. gen. 204. sp. 74.*

Lin. faun. suec. n. 669.

La lepture noire à corcelet rougeâtre. *Geoffr. paris. part. I. p. 219.*

Schwarzbrauner kleiner Holzläser. *Frisch Inf. Deut. part. 12. p. 35. §. 29.* Descriptio bona, minus figura; quis autem sine coloribus infectum hoc apte exprimat delineator?

Unbestand. *Müll. Lin. Nat. Cl. V. p. 278.*

<i>Mensuræ.</i> Longit. a cap. ad an.	5 lin. fere.
elytri	$3\frac{1}{2}$ —
Latitudo elytri	$\frac{2}{3}$ —

Habitat Viennæ.

280. BARBIPES, Bartfüßiger Bockläser.

Cerambyx niger, thorace mutico subrotundo hirsuto, elytrisque testaceis.

<i>Mensuræ.</i> Longit. a cap. ad an.	$3\frac{1}{2}$ lin.
elytri	$2\frac{1}{4}$ —
Latitudo elytrorum	$1\frac{1}{3}$ —

Olim plures legi *Viennæ* in floribus umbellatis. Mas femina duplo minor. *Mensuræ ex mare desumptæ.*

Descr.

Descr. Antennæ in mare copore longiores, in semina mediocres. Totus niger tomentosus. Thorax globoso depresso niger, sed rufo villo totas hirsutus, adparet rufus. Elytra fulvo-testacea, non nihil nitida, ad lentem hirsuta. Antennarum articulus primus crassus longior, secundus, tertius, quartus breves, simul sumti longitudine primi; hi omnes nigri; quintus iterum longus fusco ferrugineus — reliqui in unico, quod restat specimine, deficiunt. Subtus totus niger villosulus. Femora secundi & ultimi paris barbata, barba rufa; unde nomen.

281. BAJULUS, Lastragender Bockläser.

Cerambyx bajulus, thorace mutico subrotundo villoso, tuberculis duobus; antennis brevibus. *Lin. S. N. gen. 204. sp. 76.*

Lin. faun. suec. n. 672.
Pod. mus. graec. p. 36.

Leptura bajula. *Scop. carn. n. 156.*

Holzläser mit kleinen Fühlhörnern und grauen Halschild mit zwey Puncten. *Frisch Inf. Deut. part. 13. p. 17. §. 12.*

La lepture brune à corcelet rhomboidale. *Geoffr. paris. part. I. p. 218.*

<i>Mensuræ.</i> Longit. a cap. ad an.	9 lin.
elytri	6 —
Latitudo elytrorum	$2\frac{1}{2}$ —

Geoffroy specimen, quod præ manibus habeo demta magnitudine adcuratissime descripsit.