

STEPHAN BREUNING

MISSIONE 1965 DEL PROF. GIUSEPPE SCORTECCI
NELLO YEMEN (ARABIA MERIDIONALE)

COLEOPTERA LONGICORNIA: LAMIIDAE

Monsieur le Dr. Carlo Leonardi du Museo Civico di Storia Naturale de Milano était si aimable de me communiquer un petit lot de Lamiaires ramassés par Monsieur le Prof. G. Scortecci au Yemen. La faune de l'Arabie n'étant pas encore bien connue je cite toutes les espèces, tous les exemplaires se trouvant au Museo Civico di Storia Naturale de Milano.

Apomecyna lameeri Pic.: 1 ex. de Sokna (Tahama), 200 m alt., 20-VIII-65. - 1 ex. de Hammam Ali, 1600 m alt., 8-IX-65. - 1 ex. de U. El Kasaba, 550 m alt., 26-VIII-65.

Apomecyna scorteccii n. sp.: 1 ex. de El Haurat, 1550 m alt., 30-IX-65.

Eunidia kristenseni Auriv.: 1 ex. de U. Ezone, 1450 m alt., 27-VIII-65. - 1 ex. de U. El Kasaba, 550 m alt., 26-VIII-65.

Eunidia yemeniensis n. sp.: 2 ex. de Mafhak, 1550 m alt., 29-VIII-65. - 1 ex. de U. Ezone, 1450 m alt., 27-VIII-65.

Eunidia arabica n. sp.: 1 ex. de U. Ezone, 1450 m alt., 27-VIII-65. - 1 ex. de Mafhak, 1550 m alt., 29-VIII-65.

Eunidia submarmorata n. sp.: 1 ex. de Est di Radà, Rocce Nere, 1880 m alt., 22-IX-65.

Idactus cristulatus Fairm.: 1 ex. de Est de Radà, Rocce Nere 1880 m alt., 22-IX-65. - 1 ex. de Sokna (Tihama), 200 m alt., 20-VIII-65.

Paraphloeus n. gen. *scorteccii* n. sp.: 1 ex. de Taiz, 1350 m alt., 30-VII-65.

Ceroplesis elegans Gestro: 1 ex. de Taiz, 1350 m alt., 30-VII-65.

Crossotus arabicus Gah.: 1 ex. de U. El Kasaba, 550 m alt., 26-VIII-65.

Sophronica arabica Breun.: 1 ex. de Mafhak, m 1550 alt., 29-VIII-65.

Apomecyna scorteccii n. sp.

Proche d'*obliquata* Klug, mais les articles antennaires 5 à 11 réunis sensiblement plus longs que les articles 3 et 4 réunis, les lobes inférieurs des yeux 4 fois plus longs que les joues, le pronotum transverse, plus densément et moins grossièrement ponctué, les élytres faiblement tronqués à l'apex (l'angle marginal obtus), les taches élytrales formant les deux bandes transversales plus grandes et plus allongées et les élytres sans autres petites taches blanches.

Long.: 10 mm; larg.: 2½ mm.

Type de l'Arabie (Yemen): El Haurat, 1550 m alt., 30-IX-65, leg. G. Scortecci.

Eunidia yemeniensis n. sp.

Proche de *haplotrita* Auriv., mais le quatrième article des antennes un peu moins long que le cinquième ou que le scape, le disque du pronotum sans bandes blanchâtres, les élytres non marbrés de blanc, mais ornés, chacun, de 4 bandes blanches vagues, une courte et étroite longitudinale discale basilaire, une large prémédiane remontant très obliquement de la suture en direction de l'épaule, une postmédiane un peu moins large descendant très obliquement de la suture en direction du bord latéral et une plus courte pareille préapicale.

Long.: 7-8 mm; larg.: 2-2¼ mm.

Type de l'Arabie (Yemen): Mafhak, 1550 m alt., 29-VIII-65, leg. G. Scortecci; 1 Paratype idem; 1 Paratype de U. Ezone, 1450 m alt., 27-VIII-1965.

Eunidia arabica n. sp.

Proche d'*albicans* Breun., mais le quatrième article des antennes un peu moins long que le cinquième, les lobes inférieurs des yeux 5 fois plus longs que les joues, les élytres très densément et très finement ponctué par toute leur étendue.

Long.: 8 mm; larg.: 2 mm.

Type de l'Arabie (Yemen): U. Ezone, 1450 m alt., 27-VIII-1965, leg. G. Scortecci.; Un Paratype de Mafhak, 1550 m alt., 29-VIII-1965.

Eunidia submarmorata n. sp.

Troisième article des antennes étiré en une pointe apicale, le quatrième article sensiblement plus long que le cinquième ou que le scape. Lobes inférieurs des yeux deux fois plus hauts que larges, 5 fois plus longs que les joues. Pronotum faiblement transverse, éparsément et très finement ponctué. Elytres arrondis à l'apex, très densément et très finement ponctué par toute leur étendue.

Rouge, couvert de pubescence jaune grisâtre clair. Elytres à pubescence brun rougeâtre; chacun avec une assez large bande transversale basilaire blanchâtre très irrégulière, une telle pré-médiane très large et une étroite bande transversale préapicale blanche fortement zigzagüée. Pattes et antennes à pubescence brun rougeâtre.

Long.: 8 mm; larg.: $1\frac{3}{4}$ mm.

Type de l'Arabie (Yemen): Est di Radà, Rocce Nere, 1880 m alt., 22-IX-1965, leg. G. Scortecci.

Cette espèce se place près de *scotti* Breun.

Paraphloeus n. gen.

Allongé. Antennes assez fines, un peu plus longues que le corps, éparsément frangées de poils courts, le scape modérément long, faiblement granulé sur la face dorso-apicale, le troisième article beaucoup plus long que le quatrième ou que le scape. Tubercules antennifères peu saillants. Yeux finement facettés et subdivisés. Pronotum transverse, pourvu de 4 sillons transversaux droits, deux antérieurs et deux postérieurs et d'une courte épine latérale conique. Elytres longs, un peu plus larges que le pronotum, arrondis à l'apex. Saillie prosternale étroite, presque aussi haute que les hanches et arquée. Saillie mésosternale légèrement inclinée vers son bord antérieur. Pattes modérément longues, les fémurs claviformes, les tibiaux intermédiaires pourvus d'un léger sillon dorsal, les crochets divariqués.

Type: *scorteccii* Breun. Ce genre se place dans les *Ancylo-notini* à côté du genre *Stenophloeus* Breun.

Paraphloeus scorteccii n. sp.

Lobes inférieurs des yeux sensiblement moins longs que les joues. Front et pronotum très éparsément et très finement ponctués. Elytres densément et très finement ponctués.

Brun foncé, couvert de pubescence jaune paille. De chaque côté du verte une petite tache circulaire brun foncé. Disque du pronotum avec 5 taches pareilles: une oblongue médiane et deux allongées de chaque côté du milieu, une prémédiane et une basilaire. De chaque côté du pronotum une étroite bande longitudinale brun foncé allant de l'épine latérale à la base. Sur chaque élytre une grande tache postmédiane brune s'étendant du bord latéral en devenant de plus en plus obscure vers la suture, mais n'atteignant à peine le tiers sutural. Les 5 premiers articles antennaires parsemés de nombreuses très petites taches brunes, les articles 3 à 6 avec un large anneau préapical brun foncé, les articles suivants en majeure partie brun foncé sauf à la base et à l'apex.

Long.: 15 mm; larg.: $4\frac{1}{3}$ mm.

Type de l'Arabie: Taiz, 1350 m alt., 30-VII-1965, leg. G. Scortecci.

Riassunto

L'Autore elenca i *Lamiidae* raccolti nello Yemen (Arabia meridionale) nel 1965 dal Prof. G. Scortecci e conservati presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Egli descrive un nuovo genere: *Paraphloeus* e cinque nuove specie: *Apomecyna scorteccii*, *Eunidia yemeniensis*, *Eunidia arabica*, *Eunidia submarmorata*, *Paraphloeus scorteccii*.

Summary

The Author lists the *Lamiidae*-beetles collected by Prof. G. Scortecci in Yemen (Southern Arabia) in 1965 and kept in « Museo Civico di Storia Naturale di Milano ». He describes a new genus: *Paraphloeus* and five new species: *Apomecyna scorteccii*, *Eunidia yemeniensis*, *Eunidia arabica*, *Eunidia submarmorata*, *Paraphloeus scorteccii*.

Pavia — Editrice Succ. Fusi — 15 Marzo 1968

Direttore responsabile: PROF. CESARE CONCI

Registrato al Tribunale di Milano al N. 6574

