

- 498 DORCADION VITTIGERUM Panz. (*Lamia vittigera*) Faun. Germ. fasc. 48, n.° 24.
— *Lamia lineata* Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 303, n.° 118.
Hab. Communiqué par M. Duponchel.

499 PARMENA PILOSA Br. — Obscure fusca, pedibus et antennis pallidioribus, profunde et crasse punctata, punctis elytrorum minus confertis; elytris transversim cinereo-bifasciatis, antennis vero cinereo-annulatis; palpis ferrugineis. — Long. 9 millim., lat. $3\frac{1}{2}$.

DESCR. Tout l'insecte est d'un brun foncé, revêtu d'un duvet grisâtre, court et serré, et de poils longs et droits de la même couleur que le duvet, mais moins serrés. Tête marquée de points enfoncés larges et profonds; labre plus finement ponctué, légèrement rougeâtre; palpes plus clairs, mandibules noires; antennes d'un brun plus clair que le corps, couvertes d'un court duvet grisâtre plus abondant à la base des articles, ce qui les rend comme annelées: de longs poils, semblables à ceux du corps, les garnissent dans toute leur longueur. Corselet un peu plus long que large, légèrement élargi et muni d'un tubercule très-obtus sur les côtés, très-grossièrement ponctué comme la tête, mais les points plus serrés encore. Écusson triangulaire, relevé à l'extrémité, presque lisse. Élytres un peu plus larges que le corselet à leur base, ovales, assez élevées, couvertes de points enfoncés très-gros, mais plus écartés que ceux de la tête et du corselet; tous les intervalles qui se trouvent entre ces points sont eux-mêmes très-finement ponctués; on distingue sur chaque élytre deux bandes de poils d'un gris plus clair que le duvet: la première, en demi-cercle, part de l'angle extérieur de la base et descend jusqu'au tiers de l'élytre, où elle se recourbe; la seconde est transversale, sinuée et placée au tiers postérieur. Dessous du corps marqué de quelques gros points enfoncés très-écartés, et en outre très-finement ponctué, beaucoup moins velu que le dessus; extrémité de l'abdomen un peu rougeâtre. Pattes finement ponctuées, d'un brun un peu rougeâtre, revêtues d'un duvet légèrement grisâtre; jambes intermédiaires et postérieures échancrées en dehors vers l'extrémité et garnies de poils roussâtres dans l'échancrure.

Hab. Communiqué par M. Duponchel.

- 500 SAPERDA DUPONCHELII Br. — Elongata, depressa, profunde punctata, dense hirta, supra virescens, infra viridi-flavicans; antennis flavo fuscoque annulatis; thorace tuberculo laterali crasso, obtuso, linea longitudinali media lateribusque flavescens. — Long. 18 millim., lat. $5\frac{1}{2}$. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 4.)

DESCR. D'un vert foncé en dessus, plus clair et légèrement jaunâtre en dessous. Tête fortement ponctuée, parcourue dans sa longueur par un faible sillon longitudinal, lequel est revêtu d'un court duvet couché, jaunâtre, plus clair sur le

devant de la tête, et garni en outre de poils assez serrés, longs et noirâtres; labre légèrement roux; antennes annelées supérieurement de gris jaunâtre et de noir, le noir occupant l'extrémité de chaque article: le premier entièrement noir, couvert de petits poils jaunâtres. Corselet un peu moins long que large, muni sur les côtés d'un tubercule gros et mousse, grossièrement et irrégulièrement ponctué sur toute sa surface, ayant les côtés et la ligne médiane garnis de poils jaunes et serrés, le reste de sa surface et les tubercules noirs, revêtus de longs poils de même couleur. Écusson plus large que long, arrondi extérieurement, couvert de poils jaunes comme les côtés du corselet. Élytres beaucoup plus larges que le corselet, aplaties supérieurement, diminuant de largeur depuis l'angle de la base jusque vers l'extrémité, où elles s'élargissent un peu: elles sont marquées de points profonds et serrés, et surmontées de deux côtes longitudinales légères: elles doivent leur couleur à un court duvet jaune, répandu sur un fond noir. Dessous du corps et pattes beaucoup plus velus que le reste; tarsi garnis en dessous de poils roux.

Hab. Trouvé en Juin sur les fleurs de l'*Echium italicum*, n.° 265.

- 501 SAPERDA SPENCII Gyllenh. in Schœnh. Syn. Ins. app. p. 187, n.° 262. — *S. asphodeli* Latr. Illig. ined.?

Hab. A la fin d'Avril, sur les fleurs de l'*Asphodelus ramosus*, n.° 456. Cette espèce disparaît en peu de jours.

- 502 SAPERDA SUTURALIS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 326, n.° 48. — Oliv. Coléopt. IV, 68, p. 9, n.° 5, pl. 2, fig. 16.

Hab. Sur la plupart des plantes en Mai dans les environs de Modon.

- 503 SAPERDA CYNARÆ Germ. ubi?

Hab. Communiqué par M. Duponchel.

Obs. Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *S. Spencii* Gyllenh.; nous n'y connaissons d'autre différence que dans les antennes. Chez le *S. cynaræ* elles sont noires, avec un anneau de poils blancs à la base de chacun des articles, lequel en occupe tout au plus le quart de la longueur; dans le *S. Spencii* les antennes sont d'un brun clair, avec l'extrémité seule noire: toute la partie brune est revêtue d'un duvet blanchâtre, légèrement coloré en rose.

- 504 SAPERDA NIGRIPES Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 320, n.° 16. — Sturm, Verz. 1796, p. 50, n.° 20, tab. 2, fig. 8. — *S. ferrea* Panz. Faun. Germ. fasc. 97, n.° 15.

Hab. Communiqué par M. Duponchel.

- 505 SAPERDA HIRSUTULA Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 326, n.° 46. — Panz. Faun. Germ. fasc. 97, n.° 13.

Hab. Communiqué par M. Duponchel.