

Séance du 9 Novembre 1870.

Présidence de M. l'abbé DE MARSEUL, Vice-Président.

MM. Guérin-Méneville, membre honoraire, et le général de Valdan, attaché à la place de Paris, assistent à la séance.

Lectures. M. le docteur Laboulbène donne lecture d'un travail sur la larve de l'*Elmis æneus*, dont il a déjà fait part à la Société et accompagné d'une planche.

Notre collègue, dans une dédicace sous forme de lettre à M. le colonel Goureau, exprime les sentiments qu'il éprouve sur le siège de Paris. — La Société tout entière s'associe aux regrets de M. le docteur Laboulbène pour les dommages que cause aux sciences et à l'entomologie une guerre implacable et dévastatrice.

— M. Chevrolat lit la note suivante contenant la description de deux *Dorcadion* nouveaux et des observations sur quelques autres espèces du même genre :

DORCADION STABLEAUI ♂. — Angustum elongatum subparallelum, nigro fuliginosum, in prothorace lineis quatuor et in singulo elytro lineis tribus albis : marginali et suturali apice conjunctis sed humerale ante summum abbreviata, præterea in medio basis lineola alba ad lineam nigram juncta; capite anguste sulcato, antennis elongatis, fere corporis longitudine usque ad apicem attenuatis, articulis 3-5 clavatis; prothorace lateribus mediis angulato, longitudine anguste costato; pedibus nitidis. — Long. 12-13 mill.; lat. 4 1/2 mill.

C'est assurément la plus étroite des espèces de France. Elle a été découverte sur les monts Pyrénéens par notre collègue M. Stableau.

Femelle inconnue.

DORCADION DRUSUM. — Elongatum murinum; capite postice sulcato, lineolis occipitalibus duabus albidis notato; prothorace lateribus angulato, dorsalibus lineis tribus signato : duabus fuscis, media albida; elytris

elongato-oblongis, lineis quatuor fuscis : laterali integra, humerali ad medium ducta, tertia in medio et integra, suturali lata (in femina lineolis quatuor albidis obsoletis et abbreviatis); antennis tarsisque nigris. — Long. 15 mill.; lat. 4-5 mill.

M. le capitaine Coxe, à son retour de notre dernière expédition en Syrie, m'a envoyé quelques exemplaires de cette intéressante espèce. Il en avait fait la découverte dans les montagnes habitées par les Druses.

J'ai reçu l'année dernière de mon ami M. Arcas Pérez un envoi composé en totalité de diverses espèces de *Dorcadion* présentant un bon nombre de variétés indiquées comme espèces. Il est à remarquer que ces variétés s'appliquent presque constamment à des femelles, et de ce sexe trois espèces tournent au mélanisme. Je crois devoir signaler les plus tranchées.

1° DORCADION GRAELLSI Nob. — Cette espèce, très-commune à La Granja, est l'une de celles qui présentent le plus de variétés.

Le type est d'un noir velouté; l'élytre offre trois lignes d'un blanc très-pur : une marginale, une humérale, réunies au sommet, et une suturale; au milieu de la base il existe un léger trait blanc (rarement il fait défaut), qui, sur une seule femelle que je possède, se prolonge jusque vers le milieu de l'étui. Les antennes et les pattes sont généralement noires; mais ces dernières sont quelquefois ferrugineuses.

Notre *Dorcadion alternatum* n'est qu'une variété du *D. Graellsii*; il a en plus sur chaque élytre une quatrième ligne interne et parallèle à la ligne humérale, qui est d'un blanc teinté de gris.

Une troisième variété femelle est noire, de forme courte, à élytres ovales. Sur les quatre exemplaires de ma collection, deux sont entièrement noirs, et les deux autres n'ont de rouge que le premier article des antennes, les cuisses et les jambes. En raison de sa forme anormale, je donne à cette variété le nom de *D. ovale*.

2° DORCADION HISPANICUM Muls. — Le type doit être pris sur les exemplaires les plus constants.

♂. Élytres blanches, offrant chacune quatre lignes noires : latérale large, deuxième et troisième rapprochées, quatrième à égale distance de cette dernière et de la suture, toutes trois se réunissant en un seul trait sur le sommet. La femelle n'a que des rudiments de lignes noires.