

- 13-14. LAGRIA subuillofa cyanea, antennis nigris. *cyanea.*
Anobium cyaneum. Sp. Inf. 72. 7.
 Habitat in Europa australiori.
83. 14. LAGRIA subuillofa nigra, thorace elytrisque *minuta.*
cyaneis.
Anobium minutum. Sp. Inf. 72. 8.
 Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
- 21-2. CURCULIO longirostris cinereus, rostro arcuato *atrir-*
atro. *stris.*
 Habitat Lipsiae. Dom. Prof. Leske.
 Magnitudo et statura C. Equiseti. Corpus postice
 obtusiusculum, totum obscure cinereum rostro so-
 lo arcuato, atro. Pedes cinerei, femoribus sim-
 plicibus.
- 217-18. CURCULIO breuirostris, femoribus acute den- *Mali.*
 tatis, subpubescens fuscus, antennis pedibusque
 testaceis.
 Habitat Lipsiae. Dom. Prof. Leske.
 Statura et summa affinitas C. Pyri, cuius forte mera
 varietas. Corpus totum obscurum, fuscum anten-
 nis pedibusque testaceis.
- 16-17. SAPERDA cinerea, thorace lineato, elytris fuscis *nigricor-*
unicoloribus, antennis mediocribus. *nis.*
 Habitat Lipsiae. Dom. Prof. Leske.
 Statura omnino Sc. Cardui, at paullo minor. Anten-
 nae mediocres totae nigrae. Thorax rotundatus,
 niger, lineis tribus pallidis, lateralibus abbrevia-
 tis. Elytra laeuiuscula, fusca, unicoloria. Corpus ci-
 nerascens.
- 19-20. SAPERDA thorace villoso cinereo, elytris sub-*virescens.*
attenuatis viridibus.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.