

30. L. thorace tuberculato, elytris punctatis cinereis *praemorsa*.
apice bidentatis fuscis, antennis longis.
Habitat in Insula Guadeloupe de Badier.
Parva in hac familia. Antennae corpore duplo longiores, cinereae articulis apice fuscis: primo elongato. Caput cinereum. Thorax punctatus, cinereus tuberculis dorsalibus tribus maculisque utrinque duabus baseos nigris. Elytra punctata, cinerea punctisque aliquot elevatis, nigris scabra, apice bidentata: dente exteriori majori, fusco. Pedes cinerei femoribus clavatis.
31. L. thorace spinoso cinereo villosa elytris bidentatis testaceis, antennis longis. *spinifera*.
Habitat in America meridionali D. Pflug.
Media. Antennae obscure cinerae, corpore longiores. Caput & thorax villosa cinerea thorace acute spinoso. Scutellum sublavescens. Elytra laevia, testacea, apice acute bidentata. Corpus villosa cinereum.
32. L. thorace mutico grisea elytris basi tuberculis duobus apice spinosis, antennis brevibus villosis. *grifator*.
Habitat Tranquebariae Dom. de Schlanbusch.
Elytra grisea basi tuberculis duobus elevatis, compressis, apice pallidiora spinis aliquot elevatis, brevibus suturaque elevata, ferrata. Abdomen & pedes grisea.
33. L. thorace spinoso tuberculatoque grisea elytris basi bituberculatis, antennis mediocribus. *aedificator*.
Habitat in India orientali Mus. D. Lund.
Media. Antennae pilosae articulo primo elongato, crassiori. Caput canaliculatum, cinereum labio rotundato, flavescens. Thorax utrinque spinosus tuberculisque duobus. Elytra apice

- truncata, pubescentia, grisea basi angulo parum elevato, compresso, tuberculoque medio parvo, obtuso. Pedes grisei.
- amputator*. 34. L. thorace spinoso, elytris cinereis nigro irroratis maculisque numerosis testaceis.
Habitat in Americae Insulis ramos etiam crassiores abscindere dicitur. Mus. Banks.
Media. Antennae longae, cinereae. Thorax ruga media elevata cinereus. Elytra cinerea punctis parvis, subelevatis, atris irrorata maculisque numerosis, testaceis adspersa. Corpus cinereum.
- sternutator*. 35. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus.
Habitat in Insula Barbados Dom. Drury.
Antennae nigricantes articulo ultimo acuto. Thorax inaequalis. Elytra obtusa, nigra basi punctis majoribus, inaequalibus adspersa. Subtus tomento flavo tecta.
- spinator*. 36. L. thorace spinoso elytrisque basi daedaleis apice griseis, antennis mediocribus.
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.
Affinis certe praecedenti. Antennae nigrae, apice cinerae. Caput atrum. Thorax utrinque acute spinosus: dorso sinibus daedaleis exarato. Elytra basi nigra punctis majoribus daedaleis exarata, apice tomentosa, grisea. Corpus griseo nigrum.
- guttulator*. 37. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis: basi punctis elevatis glabris.
Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 92.
Habitat in Africa Mus. Britann.
Caput testaceum linea longitudinali nigra, glabra. Thorax testaceus ruga media transversali elevata. Elytra obtusa, testacea atomis flavican-