

au milieu, un sillon presque effacé en arrière; couleur grisâtre; de chaque côté, en avant, une fascie oblique, étroite, blanchâtre, ainsi que les côtés; couvert de très gros points, formant sur la partie dorsale de vraies fossettes un peu confluentes; espaces un peu inégaux. Ecusson à peine visible; base de la suture relevée autour. Elytres à base fortement sinuée de chaque côté; épaules obtuses; à lignes de très gros points formant de vraies fossettes aux trois lignes, près la suture; couleur grise, une bande dorsale et une latérale presque glabres, d'un brun-noir, interrompues par des taches irrégulières, blanches; les deux dernières oblongues; extrémité obtusément acuminée. Dessous et pattes d'un gris blanchâtre, piquetés de brun-noir. — Trouvé à Madrid, par M. le professeur J. Mieg, à qui je suis heureux de dédier ce joli insecte.

**BALANINUS RUFOSIGNATUS**, L. Fairm. (Revue et Mag. de Zool. 1855, p. 108.)

Espèce à supprimer: c'est le *B. ochreatus* de Schoenherr, espèce fort rare du midi de la France, où elle paraît vivre sur les saules. Je dois l'unique individu que je possède à la complaisance de M. Marquet, de Béziers.

#### PRIONUS BESIKANUS.

*Brunneo-piceus aut brunneo-niger, parum nitidus; prothorace latiore, lateribus trispinosis, spina media valida, spina posteriore minuta, acuta; basi fere recta; elytris rugosis vermiculatis, apicem versus sublævigatis.* — Long. ♂ 38 mill.; ♀ 40 mill.

Ce Prione ressemble au *P. coriarius*, mais il est très facile à reconnaître. La couleur varie du brun-rougeâtre au brun-noir, moins brillant que chez notre espèce. La tête est plus grosse et plus rugueuse; le sillon médian est moins arqué, tandis que le sillon transversal au-dessus du labre est plus profond et se prolonge sur la base des antennes. Les antennes du ♂ sont plus aplaties en dessus et tranchantes en dedans, jusqu'à l'extrémité; celles des ♀ sont un peu moins courtes que chez le *coriarius* ♀. Le corselet est convexe, plus grand, rugueux et densément ponctué; de chaque côté, deux épines aiguës, celle du milieu plus forte que l'antérieure; à partir de l'épine médiane, le corselet se rétrécit en arrière, et se termine à l'angle postérieur par une très petite épine, tandis que chez le *coriarius*, cette épine est arrondie, aussi forte et au même niveau que l'antérieure. L'écusson est moins ponctué. Les élytres du ♂ sont bien moins parallèles, et s'atténuent visiblement en arrière; la ♀ à la même forme; leur extrémité n'est pas tronquée; l'angle sutural est muni d'une très petite épine; elles sont couvertes de rugosités serrées, formées par de fines vermiculations plus marquées vers la base; les vestiges de côtes sont à peu près nuls. En dessous, la saillie postérieure du prosternum est évidemment moins globuleuse et plus comprimée.

La ♀ ne diffère pas du ♂ par la forme, et est à peine plus grande.

J'ai vu plusieurs individus de ce Prione, tous recueillis par notre collègue, M. Vesco, à la baie de Bésika, dans le Bosphore. Cette espèce se trouve très probablement en Europe, et c'est peut-être celui que Sturm, dans son 3<sup>e</sup> catalogue, désigne sous le nom de *patruelis*, et comme venant de Grèce.

Cette nouvelle espèce ne peut être confondue avec le *P. Asiaticus*, Faldsc. Faune Tran. III, 263, qui vient de la Perse. Ce dernier, dont il n'existe qu'une ♀, que M. le comte de Mniszech m'a obligeamment communiquée, ressemble à la ♀ du *coriarius*, mais offre sur les élytres des côtes distinctes, assez fortement prononcées à la base, et l'angle postérieur du corselet est formé par un angle saillant, très arrondi; l'épine suturale manque.

#### POGONOCHERUS DECORATUS.

*Oblongo-elongatus, fere parallelus, dense cinereo pubescens pilis nigris sparsim erectis; antennis corpore paulo longioribus, intus parce pilosis, articulis fuscis basi rufo griseis; prothorace subquadrato, lateribus medio spina brevi armatis; medio carinula longitudinali brevi, et utrinque altera transversali brevioribus; elytris elongatis, ad scutellum leviter infuscatis; utrinque vitta nigricante, ab humeris incipiente, ante medium dorsum versus angulata et postice producta; elytris apice separatim rotundatis.* — Long. 6 mill.

Oblong, un peu allongé, d'un brun-noir, mais recouvert d'une pubescence assez forte et serrée, d'un cendré un peu roussâtre. Tête noirâtre en avant, sillonnée longitudinalement; palpes d'un brun-noir; antennes un peu plus longues que le corps, garnies, en dedans, de poils raides, écartés; articles d'un brun-noir, avec la base d'un rougeâtre clair. Corselet pas plus large que la tête, au bord antérieur, un peu rétréci à la base, très peu élargi au milieu, formant une petite pointe de chaque côté; au milieu, une ligne longitudinale lisse, élevée, et, de chaque côté, une petite élévation lisse, mal déterminée en avant; ponctuation assez forte en avant, très fine en arrière. Ecusson court, d'un