

DICHOSTATES SUBOCELLATUS. — Long. 20 mill. — *Sat brevis, robustus, fusco-brunneus, indumento pubescente dense vestitus, squalide griseo-cinerascens, lineis obcuris rufulo maculosis vage vittulatus, elytris basi utrinque penicillo brevi rufulo et disco medio macula grisea vage determinata, postice macula rufulo-velutina limitata signatis; capite summo obscuriore, vittis 3 fuscis, lateralibus paulo elevatis, mediana sulcata; antennis corpore haud longioribus, subtus pilosis, articulo 1^o fusco valde maculato, 3^o supra obscuro, sequentibus apice interdum paulo infuscatis; prothorace transverso, elytris angustiore, inaequali, lateribus postice utrinque dente sat valido munito, dorso antice transversim impresso et plicato, postice medio longitudinaliter carinulato, rufulo vage mixto, fusco antice bisignato et postice trisignato, et punctis fuscis sparsuto; scutello lato, subtruncato; elytris ad humeros sat fortiter angulatis, postice leviter attenuatis, apice obtuse rotundatis, basi intus grosse sed parum distincte punctatis, humeris paulo granulatis, lineis aut potius venulis parum elevatis, extus evidentioribus et longius prolongatis; subtus densissime albido-pubescentis, cum pedibus fusco punctatus, segmentis ventralibus apice dense rufulo fimbriatis, ultimo late impresso et sat longe fulvo-piloso, basi medio spatio minuto denudato et foveola minuta signato; tarsis latis, paulo obscuris.*

Ce *Dichostates* est d'une forme large et trapue qui rappelle celle de certains *Coptops*; ses élytres présentent à la base une petite houppette de poils veloutés roussâtres, autour de laquelle on voit une teinte veloutée de même coloration; au milieu de chaque élytre il y a une tache blanchâtre, mal limitée et bordée en arrière par une petite tache, souvent peu distincte, de poils veloutés roussâtres; cette teinte se retrouve plus pâle, en macules, sur des espèces de nervures peu régulières, plus marquées en dehors, presque effacées vers la suture, qui est un peu relevée.

POGONOCHERUS CRISTULATUS. — Long. 6 1/2 mill. — *Oblongus, fuscus, dense pubescens, brunneo et griseo-albido variegatus; capite valde reclinato, antice griseo, inter oculos transversim bi-infuscato, summo medio plaga magna brunnea; antennis sat gracilibus, corpore paulo longioribus, subtus dense villosis, griseis, articulis apice fuscis, 1^o crasso, basi et apice obscuro; prothorace subquadrato, elytris angustiore, lateribus medio obtuse angulato, dorso griseo et brunneo vario, inaequali, fere medio tuberculo oblongo, fusco signato, basi transversim paulo depresso, griseo, medio striolis 2 fuscis brevissimis; scutello lato, obtuse rotundato; elytris basi truncatis, ad humeros angulatis, a basi leviter attenuatis, apice sepa-*

ratim obtuse rotundatis, medio griseo-albidis, postice signaturis brunneis oblique signatis, lateribus rufulis, basi paulo infuscatis et prope scutellum utrinque cristula brevi, compressa, antice leviter arcuata signatis, sutura anguste rufula; subtus cum pedibus albido-griseus, punctis brunneis sparsutus, propleuris brunneo vittatis, femoribus crassis, tibiis basi et apice fuscis, tarsis infuscatis, supra griseo-pubescentibus.

Ressemble un peu au *fascicularis*; mais les élytres sont plus arrondies à l'extrémité et présentent chacune à la base une petite crête longitudinale, assez courte, assez saillante; le corselet n'offre pas les deux reliefs antérieurs, mais il en a au milieu de la base; l'écusson n'est pas d'un noir velouté; les élytres n'ont pas de côtes, ni de taches d'un noir velouté; enfin le 3^e article des antennes est un peu plus long que le 4^e.

DISCOLOPS, nov. gen.

Caput subretractile, sat fortiter concavum, tuberculis antennariis sat productis. Antennæ corpore haud longiores, subtus breviter et laxe ciliatae, articulo 1^o oblongo, tertio paulo longiore, 3^o 4^o que æqualibus, ceteris paulatim decrescentibus. Oculi mediocres, sat fortiter granulati, valde emarginati. Prothorax subcylindricus, lateribus inermis. Scutellum quadratum, truncatum. Elytra prothorace latiora, ad humeros angulata, postice attenuata, apice extus spinosa, dorso planata, costata. Pro- et mesosternum sat lata, arcuata, acetabula antica et intermedia clausa. Pedes sat breves, tibiæ 4 postice extns apice leviter impressæ, tarsi sat breves, articulo 1^o secundo parum longiore.

Ce genre me paraît appartenir à la tribu des Péricoptides et se placerait près des *Plocia*, dont il diffère par les pattes courtes, le corps couvert de pubescence serrée, le mésosternum arqué et non tronqué en avant, le prothorax non rétréci en avant et ayant à la base 6 sillons ne dépassant guère le milieu, et les antennes à 1^{er} article plus long que le 3^e.

DISCOLOPS STRIGICOLLIS. — Long. 7 mill. — *Elongatus, sat convexus, fusco-brunneus, pube densa vestitus, capite dense squalido-albicante, prothorace sat denudato, maculis ferrugineo-pubescentibus sparsuto, elytris griseis, vitta suturali basi latiore et utrinque vittulis discoidalibus vix post medium brunneis, pedibus antennisque rufulo-griseis, his articulis 2 primis obscurioribus, femoribus basi et tibiis apice infuscatis; capite inter antennas profunde cavato, his corpore haud longioribus, subcylindricis, articulis 2-5 subtus tenuiter pubescentibus, articulis ultimis paulo decrescentibus; prothorace subquadrato, lateribus vix arcuatis, dorso*