

dugas brancas laterals, és encara irregular, però se torna més gran, sense que per això se puguin reconèixer altres cèl·lules cilíndriques. Les cèl·lules cúbiques o cilíndriques abocinades portan en sa superfície lliure filaments protoplasmícs granuloses que tapiçan en gran part la cavitat intestinal, separant-se alguna vegada dels elements subjacents baix la forma de massa coherent, deixant darrera d'ells cèl·lules de contorns ben marcats y d'àngols arrodonits. Per més que l'intestí és estret, sa paret és visible, essent molt contràctil, encara que res pot dirse dels músculs que entran en sa estructura.

B. PEDEMONTE Y FALGUERA

(Seguirà)

DOS COLEÓPTEROS NUEVOS

I

Vesperus hispalensis, sp. nov.—Long. 10-15 mm.—Lat. 3-4 mm.

Subvillosus, ochroleucus; elytris pallidioribus, stramineis; oculis nigris, sicuti acies et apex mandibularum; abdomine fusco, segmentorum margine postica luridata.

Caput basi subquadratum, non inflatum, læve, indistincte punctatum; vertice glabrato, tantum fronte pilositate rara, erecta; oculis subglobosis, prominulis, antice non approximatis; fronte lata, tenuiter sulcata, leviter foveolata, antrorsum arcuatim submarginata. Antennæ articulo 1.º modice incrassato, 2.º 1.º dimidio brevior, conico, latitudine longior, 3.º-11.º elongatis, subæqualibus. *Prothorax* lævis, glabratus, conicus, priorsum valde angustus, atque in hoc loco parce marginatus, basi vero subsulcatus, indistincte punctatus. *Scutellum* subtriangulare. *Elytra* in ♂ angusta, basi parum quam apice ast duplo prothorace latiora, lævia, non striata, sparsim punctulata; in ♀ latiora, breviora, extremitate divaricata. *Abdomen* in ♂ cuneiforme, depressum; in ♀ convexum, latum.

Hispali a Dño. Medina Ramos abunde collectus.

La nueva especie difiere: del *Vesp. luridus*, Rossi, por los ojos no aproximados anteriormente, por la cabeza y pronoto lisos, ni rugosos ni punteados, por el 2.º artejo de las antenas menos corto, etc.: del *Vesp. brevicollis*, Graells, y su var. *Sanxi*, Mart., por el 2.º artejo de las antenas más largo que ancho, por los ojos subglobosos, por la cabeza y pronoto no punteados ni setulosos, por la foveola frontal poco marcada, por el protórax más estrecho y más largo, por la forma diferente del escudo, etc.: del *Vesp. flavolatus*, Muls., por la cabeza no hinchada posteriormente, por el surco de la frente superficial, poco profundo, por los ojos prominentes, por el protórax más largo que ancho, los élitros con puntos esparcidos, sin costillas, por el escudete subtriangular, etc.: del *Vesp. conicicollis*, Fairm., por la frente más ancha entre los ojos y menos excavada, por la cabeza redondeada posteriormente (esta parte es ob-cónica en el *V. conicicollis*), por el protórax menos cónico, más ancho, el escudo semicircular, etc.; y de todos por el color pardusco del abdomen.

No sin grandes vacilaciones y después de consultar á varios entomólogos eminentes, me he decidido á publicar este nuevo *Vesperus*, cuya autenticidad específica es indiscutible.

El *Vesp. hispalensis* procede, como el nombre indica, de Sevilla, en donde fué recogido hace algunos años en gran número de ejemplares, que la luz eléctrica de la estación atraía, por nuestro amigo el joven Dr. D. Manuel Medina Ramos. Entre los doscientos ó más ejemplares que me fueron enviados sólo pude obtener dos ♀ ♀.

II

Phytodecta variabilis, Oliv., var. *Navasi*, nov.

Statura minore. Long. 6, lat. 2-5 mm.

Caput oculique atra, macula testacea in media fronte, antennis quatuor vel