

2. *C. fuscum*.
Prope Barnaul passim.
3. *C. luridum*.
Prope Smeïnogorsk rarius.
4. *C. rusticum*.
Ubique frequens.
5. *C. striatum*.
Frequens.
6. *C. violaceum*.
Ubique frequens.

Molorchus.

1. *M. abbreviatus*.
Prope Barnaul passim.

Acanthocinus.

1. *A. aedilis*.
Ubique frequens.
2. *A. griseus*.
Ubique rarior.
3. *A. varius*.
Ubique frequens.
- 4 et 5. duae species dubiae.

Pogonocherus.

1. *P. fasciculatus*.
Frequens.

Monochamus.

1. *M. Saltuarius* Esch.
Eschscholtz in lit. — Thorace spinoso, antennis

annulatis, elytris linearibus, albido-variegatis,
antice granulatis.

2. *M. Sartor*.
In sylvis frequens.

3. *M. Sutor*.
Ibidem.

Lamia.

1. *L. Myops* Dalm.
Schönherr. l. c. III. app. p, 168. — Prope Barnaul,
Riddersk et Salair non infrequens.
2. *L. Textor*.
In sylvis frequens.

Dorcadion.

1. *D. carinatum*.
Prope Barnaul sub quisquiliis et in viis m.
Jun. frequens.
2. *D. Glycyrrizae* Pall.
Pallas itin. ed. gall. VIII. p. 144. — icon. Tab.
F. fig. 7 Fischer. l. c. II. p. 259. Tab. L. fig. 1. 2. —
Pallas hanc speciem legit inter Semipalatinsk et
Smeïnogorsk; inde accepi plurima specimina *D.*
politi, nec unicum *D. Glycyrrhizae*. Hujus spe-
cimina, quotquot possideo, collecta sunt in pla-
nitiebus ad fl. Irtysch ultra fortalitium Buch-
tarminsk.
3. *D. politum* Böb.
Fischer. l. c. fig. 3. 4. — Dalmann analecta
entomologica p. 68. Prope Smeïnogorsk, Lok-
tewsk et ad fl. Irtysch frequens. Variat pedi-
bus plus minusve piceis.