

Selten im Altai, häufiger in den kusnezsk. Gebirgstälern, besonders am Fl. Ters.

3. *L. livida* F.

Bei Barnaul und überall häufig.

4. *L. quadrivittata* m.

Ledebour l. c. pag. 193.

Nigra, elytris elongatis, concoloribus, vittis duabus disci testaceis, pedibus rufis.

Long. 4 lin.—lat. $1\frac{1}{8}$ lin.

Im Altaigebirge wurde sie ein einzigmal von Ledebour gefunden; ein anderes Exemplar erhielt ich vom Baikal.

5. *L. Renardii* m.

Nigra, griseo-pubescentis, elytris sublinearibus, apice acute truncatis, nitidulis, supra subconvexis, ruguloso-punctatis.

Long. $3\frac{1}{4}$ —4 lin.—lat. $1-1\frac{1}{4}$ lin.

Caput magnum, rotundatum, deplanatum, confertim punctatum, nigrum, opacum, ante antennis transversim impressum, griseo-pubescentis; labro transversim, truncato, nitidulo; oculi magni, reniformes, nigri. Collum constrictum, confertim punctatum, pilosum. Antennæ tenues, lineares, dimidium corporis superantes, parum pubescentes, articulis intermediis elongatis. Thorax capite cum oculis subangus-

tior, opacus, pilosus, apice truncatus, anti-et postice subconstrictus, lateribus parum dilatatus, basi leviter bisinuatus; supra convexus, confertim ruguloso-punctatus, antice et postice modice reflexus. Scutellum triangulare, subtiliter punctatum. Elytra basi thorace multo latiora, truncata, illo plus triplo longiora, humero prominulo, lateribus linearia, margine inflexa, postice parum angustata, acute truncata, nec emarginata; supra convexiuscula, pone humerum impressa, nitidula, confertim ruguloso-punctata. Corpus subtus nitidum, subtilissime ruguloso-punctatum, parce griseo-pubescentis. Pedes elongati, tenues, parce pubescentes, femoribus subcompressis, tibiis rectis, tarsis griseo-spongiosis.

Sie ist der *L. cincta* var. *nigra* sehr ähnlich, aber mir scheint, durch die breiteren, hinten nicht ausgerandeten, stärker punktirten, konvexern und glänzenderen Flügeldecken wesentlich von ihr verschieden. Graf Mannerheim ist derselben Ansicht, meint aber, ob die schwarze Abart der *L. cincta* nicht hierher zu ziehen sei. Man hat aber, nach Gyllenhal, auch schwarze Weibchen von dieser. Unter den 4 Exemplaren, die ich jetzt von *L. Renardii* vor mir habe, glaube ich, der längern Fühler, der etwas engeren Gestalt und des mehr gekrümmten, dünnern Hinterleibs wegen ein Männchen zu besitzen, das aber in der Form der Flügeldecken ganz mit den übrigen übereinkommt.

Selten im kusnezsk. Gebirge.

Ich zierte sie mit dem Namen unsers hochverdien-

ten und sehr gefälligen Sekretairs der moskauischen naturforschenden Gesellschaft.

6. *L. rufiventris* m. Dej.

Ledebour l. c. pag. 193 *L. rufiventris*.

Bulletin 1841. N^o IV. pag. 614. *L. maculata* m.

Dejean Catalogue pag. 382.

Nigra, nitidula, thorace granulato, antice et postice constricto, elytris macula basali, fascia extrorsum sinuata medii punctoque apicis, tibiis tarsisque testaceis.

Mas: abdomine rufo.

Var. b. macula baseos cum fascia confluenta.

Fem: major et latior, abdomine nigro, elytris lineis duabus vel tribus obsolete, elevatis.

Var. b. maculis tribus oblique dispositis loco fasciae medii.

Long. $4-6\frac{1}{2}$ lin.—lat. $1\frac{1}{4}-2$ lin.

Sie ist feiner punktirt, als *L. guttata*. Ich trennte früher beide, da sie aber, ausser der Farbe, ganz übereinkommen, die mit rothem Unterleibe alle Männchen, mit schwarzen Weibchen sind, eins der letztern auch die Zeichnung der Flügeldecken der Männchen hat, sie auch an denselben Orten vorkommen, so glaube ich, sie vereinigen zu müssen. Gr. Mannerheim stimmt auch damit überein.

Selten bei Riddersk und im kusnezsk. Gebirge.