

C. Arietis angustius. Caput nigrum, fronte flavo tomentosa, antennis fuscis. Thorax oblongus lineis tribus dorsi asperis, niger, opacus, margine antico posticoque flavis. Coleoptera angusta, apicem versus magis angustata, apice truncata, extus spinosa, atra, opaca, cruce basali, striga obliqua media fasciaque transversa infra medium flavis. Pectus nigrum, maculis duabus lateralibus flavis. Abdomen flavum, segmentis basi nigris. Pedes nigri, intermedii valde elongati.

.693) **CALLIDIUM** (*Clytus*) **CAPRA**: thorace globoso, atrum, antennis tibiis tarsisque fulvis, elytris fasciis flavis: secunda antrorsum arcuata; apice rotundatis, muticis. Habitat in Sibiria.

Affine certe *C. Antilope* Schönh. (*Arietis* Fabr.) sed elytra longiora, apice rotundata, fascia secunda magis obliqua et femora tota atra. Caput atrum, fronte lineis duabus flavis. Antennae fulvae, articulo primo nigro. Thorax uti in *C. Arietis*, globosus, ater, margine antico et postico flavis. Scutellum flavum. Elytra angusta, atra, fasciis angustis flavis: prima obliqua infra humerum, ad scutellum abbreviata, secunda a medio circulatim scutellum versus ducta, extus interrupta, tertia recta infra medium, quarta apicem occupat. Apex elytrorum rotundatus. Corpus subtus atrum, pleuris et abdominis segmentis margine flavis. Pedes atrii, tibiis tarsisque fulvis.