

Новые виды *Compsodorcadion* русской фауны (Coleoptera, Cerambycidae).

В. Е. Яковлева (Евпаторія).

Въ дополненіе къ послѣднему обзору видовъ этого подрода ¹⁾, мнѣ приходится, совершенно неожиданно, давать описанія новыхъ видовъ, полученныхъ недавно, благодаря любезному содѣйствію А. П. Семенова и Г. Л. Суворова.

Кромѣ того, въ моемъ распоряженіи находится еще нѣсколько женскихъ экземпляровъ, установленіе по которымъ новыхъ видовъ представляется затруднительнымъ и вообще нежелательнымъ, въ виду того обстоятельства, что многія самки до того рѣзко отличаются отъ самцовъ, что, не имѣя въ рукахъ обоихъ половъ, можно описать одинъ и тотъ-же видъ два раза; поэтому, относительно этого подрода, я держусь правила — устанавливать виды только по самцамъ.

Для опредѣленія мѣста новыхъ видовъ въ системѣ, я дѣлаю указанія на послѣднюю синоптическую таблицу (l. c., pp. 33—37).

1. *Compsodorcadion suvorovi*, n. sp.

6 (13). 1-er article des antennes aussi long que le 3-e.

7 (10). Elytres à deux bandes dorsales (bande 2-e, ou interne étant parfois peu distincte); abdomen glabre, sans poils, ou avec quelques poils très écartés.

a (b). 1-er article des antennes et cuisses rougeâtres, noires au sommet; épines prothoraciques très saillantes, aiguës, dirigées en arrière; côtes humérale et dorsale inégales, transversalement ridées, comme denticulées dans leur partie basale; bande humérale blanche des élytres régulière, entière, 1-e bande dorsale assez large, régulière seulement au bord externe, 2-e bande dorsale plus étroite, très irrégulière, confluyente parfois avec la bande externe; pattes grêles; brosse

¹⁾ Revue Russe d'Entom., VI, 1906, № 1—2, pp. 32—48.

de poils des tibias intermédiaires rousse; tarses postérieurs plus courts que les tibias postérieurs, noirs, à 4-e article parfois rougeâtre. Long. ♂ 15—17 mm.

C. suvorovi, n. sp.

b (a). Pattes (excepté les tarses) et 1-er article des antennes entièrement rougeâtres.

♂. Туловище узкое, стройное, одѣтое бархатисто-чернымъ покровомъ, съ продольными полосками бѣлаго цвѣта.

Голова небольшая, почти голая, кромѣ обычныхъ затылочныхъ пятенъ и двухъ пятнышекъ между основаніями усиковъ бархатисто-чернаго цвѣта; лобъ плоскій, съ рѣдко разбросанными точками; усики черные, кромѣ 1-го членика, основныя $\frac{2}{3}$ котораго рыжевато-краснаго цвѣта, немного не достигающіе до конца надкрылій; первый членикъ одинаковой или почти одинаковой длины съ 3-мъ.

Переднеспинка выпуклая, нѣсколько болѣе развитая въ ширину по заднему краю (4 мм.), чѣмъ въ длину (3,6 мм.), съ очень длинными, тонкими боковыми шипами, обращенными остріемъ назадъ; три обычныхъ продольныхъ полосы узкія, бѣловатыя, по бокамъ слабо выраженныя; основной черный покровъ иногда отлиываетъ бурымъ цвѣтомъ. Щитокъ небольшой, слабо волосистый.

Надкрылья болѣе чѣмъ въ три раза (12,2 мм.) длиннѣе переднеспинки, удлинено-овальные, сильно суживающіяся въ задней трети; окраинная бѣлая полоска, расширенная кзади, съ неправильными зубцами по внутреннему краю; плечевая полоска цѣльная, довольно широкая, достигающая до конца надкрылій, 1-ая спинная нѣсколько уступаетъ въ ширинѣ плечевой, съ внѣшнимъ краемъ совершенно ровнымъ, правильнымъ, но внутренній ея край слегка волнистый или зазубренный; она немного не достигаетъ до конца надкрылій и назадъ почти соприкасается съ окраинной полоской, но обыкновенно не сливается съ ней; 2-ая спинная, хотя и цѣльная, но съ краями чрезвычайно неправильными, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти сливается съ 1-ой, отдѣляясь отъ нея лишь нѣсколькими черными пятнышками, или же черной узкой полоской; она отдѣляется отъ тонкой сутуральной полосы рядомъ болѣе или менѣе неправильныхъ черныхъ мѣстами — темно-бурыхъ, пятенъ, сливающихся иногда въ болѣе или менѣе короткія полосы; плечевое и спинное ребра попеременно-морщинистыя по всей своей длинѣ, въ основаніи же усажены неправильными зубчиками въ видѣ бугорковъ; спинное ребро на $\frac{1}{3}$ не достигаетъ до конца надкрылій.

Нижняя сторона туловища, особенно брюшко, почти голая; части груди, а также брюшко по бокамъ, бываютъ иногда одѣты негустымъ сѣроватымъ покровомъ; отростокъ переднегруди вдвое уже среднегрудного. Ноги тонкія, длинныя; голени задней пары ногъ нѣсколько короче бедеръ той-же пары, а тарсы, въ свою очередь, замѣтно короче голеней; ноги красновато-рыжаго цвѣта, кромѣ самыхъ концовъ бедеръ, на которыхъ замѣтно темно-бурое кольцо; тарсы черные, иногда

основаніе 1-го членика и весь послѣдній бываютъ буровато-рыжаго цвѣта; 1-й членикъ тарсовъ задней пары замѣтно длиннѣе 4-го.

♂. Дл. 15,5—17 мм., шир. 6—6,5 мм.

♀. Крупнѣе и шире ♂, съ одинаковымъ расположеніемъ бѣлыхъ полосъ на надкрыльяхъ, при чемъ 2-я спинная отдѣлена отъ 1-ой болѣе широкимъ промежуткомъ; 1-я спинная почти цѣльная, съ ровными краями, какъ и плечевая; переднеспинка очень короткая, съ длинными, крючковатыми боковыми шипами; конечности окрашены такъ-же, но красный цвѣтъ ихъ менѣе яркъ.

♀. Дл. 20 мм., шир. 8,5 мм.

Джаркентскій уѣздъ, Семирѣченской обл.: въ горахъ, прилегающихъ къ долину р. Или.

2. *Compsodorcadion amymon*, n. sp.

15 (18). Bordure externe blanche des élytres régulière à son côté interne, ainsi que les bandes humérale et dorsale externe.

16 (17). Epines latérales du pronotum courtes, émoussées; pronotum égal, revêtu d'un duvet très dense; antennes, cuisses et duvet de la surface noirs. Long. ♂ 16—18 mm.

C. abakumovi J. Thoms.

17 (16). Epines latérales du pronotum bien développées, aiguës; pronotum grossièrement et rugueusement ponctué.

a (b). Duvet de la surface brun-roussâtre; pronotum à peine poilu, peu convexe; front couvert de fine ponctuation éparse; pattes et 1-er article des antennes rougeâtres; brosse de poils des tibias intermédiaires rousse; tarses postérieurs plus courts. Long. ♂ 14 mm.

C. sokolovi B. Jak.

b (a). Duvet de la surface noir; pronotum assez densément revêtu, convexe; front couvert de forte ponctuation éparse; brosse de poils des tibias intermédiaires noire; tarses postérieurs plus longs. Long. ♂ 15 mm.

C. amymon, n. sp.

♂. Туловище довольно вытянутое, овальное, одѣтое бархатисто-чернымъ покровомъ, съ цѣльными бѣлыми полосками на элитрахъ, кромѣ 2-й спинной, которая бываетъ иногда едва намѣчена; боковые шипы переднеспинки небольшіе, но хорошо выраженные, обращенные вершиной прямо въ сторону; ноги и усики у типической формы сполна чернаго цвѣта.

Голова небольшая, съ обычными пятнами, неясно выраженными на затылкѣ, который довольно грубо морщинисто-пунктированъ; лобъ плоскій, почти голый, покрытый рѣдкими грубыми точками, и полу-прилегающими черными щетинками; усики черные, на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ не достигающіе до конца надкрылій; 1-й членикъ ихъ массивнѣе прочихъ, гораздо длиннѣе 3-го; первый членикъ очень измѣнчивъ по цвѣту: иногда онъ бываетъ буроватымъ только въ основаніи, иногда же

красновато-бурый цвѣтъ занимаетъ основныя три четверти, рѣже — весь членикъ рыжевато-красный съ темнымъ пятномъ на вершинѣ.

Переднеспинка выпуклая, особенно надъ заднимъ краемъ, немного болѣе развитая въ ширину по заднему краю (3,2—4,0 мм.), чѣмъ въ длину (3,0—3,5 мм.), съ небольшими, тонкими боковыми шипами, почти цилиндрическими, обращенными вершиной прямо въ стороны и загнутыми вверхъ; они помѣщаются почти посрединѣ переднеспинки; три обычныхъ бѣлыхъ полосы узкія; верхняя сторона ея съ крупно-морщинистой пунктировкой, что особенно ясно выражено у экземпляровъ слабо одѣтыхъ покровомъ; у другихъ же скульптура эта мало замѣтна; щитокъ небольшой, трехугольный, одѣтый бѣлымъ покровомъ.

Надкрылья въ три или немного болѣе раза длиннѣе переднеспинки, удлинненно-овальные, на заднемъ концѣ широко округленные; окраинная бѣлая полоска шире остальныхъ, съ краями совершенно ровными, цѣльными, такъ-же какъ плечевая и 1-я спинная; 2-ая же спинная у нѣкоторыхъ особей едва намѣченная, у другихъ хорошо выражена, хотя неправильная и часто разорванная; плечевая и 1-я спинная передъ концомъ надкрылій обыкновенно сливаются, но 2-я спинная далеко не достигаетъ до конца ихъ. Плечевыя ребра довольно развиты, съ поверхностью неровной, зернистой въ основаніи, но эта особенность слабо замѣтна у экземпляровъ свѣжихъ, сполна одѣтыхъ покровомъ. Бѣлыя полосы надкрылій почти всегда покрыты черными точками отъ просвѣчивающаго пунктира.

Нижняя сторона туловища густо одѣта пепельно-сѣрымъ покровомъ; отростокъ переднегруди вдвое уже среднегрудного; ноги сравнительно тонкія, довольно длинныя; бедра задней пары одинаковой длины съ голеньями той-же пары, но гораздо длиннѣе тарсовъ; внѣшняя вырѣзка на среднихъ голеньяхъ со щеткой волосъ чернаго цвѣта; первый членикъ заднихъ тарсовъ на $\frac{1}{4}$ длиннѣе 4-го членика ихъ. Цвѣтъ ногъ весьма измѣнчивъ; у типической формы онѣ сполна черныя, у другихъ — буровато-красныя сполна, или съ примѣсью чернаго, наконецъ бываютъ ноги рыжевато-красныя, съ чернымъ пятномъ только на вершинѣ бедръ; тарсы всегда чернаго цвѣта, иногда только основаніе 1-го членика бываетъ буроватое, такъ-же какъ и когти. Щетка волосъ на среднихъ голеньяхъ всегда чернаго цвѣта.

Дл. 15—15,5 мм., шир. 6—7,2 мм.

♀. Бѣлыя полосы: окраинная, плечевая и 1-я спинная — цѣльныя, какъ у ♂; 2-я спинная довольно широкая, сильно разорванная, иногда мало замѣтная, болѣе или менѣе прилегаетъ къ шовной полоскѣ, бураго цвѣта, съ черными пятнами; основная половина 1-го членика усиковъ и ноги буровато-красныя.

Дл. 16—19 мм., шир. 7,5—8 мм.

По берегамъ р. Или, въ горахъ около Джаркента.

Видъ этотъ принадлежитъ къ небольшой группѣ формъ (сюда относятся только *C. abakumovi* и *C. sokolovi*), у которыхъ окраинная

бѣлая полоса надкрылій цѣльная, ровная; но хорошо отличается отъ нихъ признаками, указанными въ табличкѣ.

Compsodorcadion dubianskii, n. sp.

28 (37). Antennes à 1-er article rougeâtre, soit entièrement, soit seulement à la base.

29 (30). Bandes longitudinales blanches des élytres régulières, entières.

a (b). 1-er et 2-e articles des antennes, cuisses et tibias entièrement rougeâtres; côtes des élytres glabres, égales; épines latérales du pronotum assez fortes, aiguës, mais moins allongées; taille et pattes plus robustes. Long. ♂ 18 mm.

C. dubianskii, n. sp.

b (a). 1-er article des antennes rougeâtre à la base; cuisses et tibias rougeâtres, largement noirs au sommet; côtes des élytres denticulées ou granuleuses; épines latérales du pronotum très allongées; taille et pattes plus sveltes. Long. ♂ 15—16 mm.

C. mystacinum Ball.

♂. Туловище довольно узкое, сверху бархатисто-чернаго цвѣта, надкрылья съ гладкими, выступающими ребрами и бѣлыми полосами; первые два членика усиковъ и ноги (кромя тарсовъ) красныя.

Голова довольно массивная; лобъ покрытъ рѣдкими, но крупными точками, а затылокъ, кромѣ небольшихъ точекъ, еще мельчайшимъ пунктиромъ (пушистый покровъ головы у моего экземпляра стертъ); 1-й членикъ усиковъ длиннѣе 3-го и вмѣстѣ со 2-мъ однообразнаго краснаго цвѣта; верхнія окраины бугорковъ, поддерживающихъ усики, также красноватыя; переднеспинка довольно сильно развитая, короче (3,7 мм.) своей ширины по заднему краю (4,2 мм.), съ сильными, крючковатыми шипами, загнутыми взадъ; передняя окраина переднеспинки ребровидная; бѣлыя продольныя полосы цѣльныя, изъ нихъ боковыя довольно широкія; щитокъ короткій, языковидный.

Надкрылья въ $3\frac{1}{4}$ раза длиннѣе (12 мм.) переднеспинки, суженныя нѣсколько болѣе кзади, чѣмъ кпереди, съ одной спинной бѣлой полоской; внѣшняя окраинная полоса довольно широкая (кромя основной половины), съ внутреннимъ краемъ очень неровнымъ, зубчатымъ; плечевая — цѣльная, достигающая до конца надкрылій; спинная полоска вдвое уже плечевой, также цѣльная, но на $\frac{1}{4}$ короче ее и не сливающаяся съ ней ни въ основаніи, ни на концѣ; сутуральная полоска узкая; плечевое ребро сильное, немного не достигающее до конца надкрылій, совершенно гладкое; спинное ребро болѣе тонкое, гладкое и очень укороченное.

Нижняя сторона брюшка голая (м. б. стертая?); отростокъ переднегруди вдвое уже среднегрудного. Ноги довольно толстыя, короткія, рыжевато-краснаго цвѣта, кромѣ тарсовъ; бедра задней пары нѣсколько длиннѣе голеней той-же пары; внѣшняя вырѣзка на сред-

нихъ голеньяхъ неглубокая, со щеткой волосъ рыжеватаго цвѣта; задняя пара тарсовъ гораздо короче голени, съ первымъ членикомъ на $\frac{1}{4}$ длиннѣе четвертаго.

Дл. 18 мм., шир. 7 мм.

♀. Крупнѣе и гораздо шире ♂, съ одинаковымъ расположеніемъ бѣлыхъ полосъ; ребра надкрылій сильнѣе выражены, гладкія; цвѣтъ конечностей одинаковый, съ тою только разницею, что красный цвѣтъ первыхъ двухъ члениковъ усиковъ распространяется и на основаніе 3-го; ребро по переднему краю переднеспинки также красновато-бурое.

Дл. 20 мм., шир. 9 мм.

Ст. Кара-тургай, Оренбургско-Ташкентской жел. дороги (12. VI. 1904. В. А. Дубянский!).

Compsodorcadion validipes, n. sp.

2 (5). 1-er article des tarses postérieurs aussi long que le dernier; cuisses noires.

3 (4). Epines latérales du pronotum très développées et aiguës; bordure externe blanche des élytres étroite; bande humérale élargie seulement à la base, rétrécie ensuite et plus ou moins interrompue; bande dorsale nulle; brosse de poils des tibias intermédiaires et les poils des tibias postérieurs noirs. Long. ♂ 23—24 mm.

C. ganglbaueri B. Jak.

4 (3). Epines latérales du pronotum courtes; bordure externe blanche des élytres large; bande humérale large, entière; bande dorsale étroite; brosse de poils des tibias intermédiaires rousse, ainsi que les poils des tibias postérieurs.

a (b). Antennes plus courtes; épines latérales du pronotum petites, mais aiguës, placées au milieu du bord latéral; élytres presque parallèles, à côtes humérales glabres, très vaguement ponctuées; duvet de la surface très pâle, d'un jaune roussâtre; bande dorsale plus large, mais peu distincte, très interrompue; articles basals (1-er et 2-e) des tarses postérieurs à lobes courts, emoussés. Long. ♂ 20 mm.

C. validipes, n. sp.

b (a). Antennes plus longues; épines latérales du pronotum larges, emoussées, placées en avant du milieu du bord latéral; élytres subarrondies, à côtes humérales rugueusement ridées, surtout à la base; duvet de la surface d'un brun noirâtre; bande dorsale très étroite, presque linéaire; articles basals des tarses postérieures à lobes allongés, très aigus. Long. ♂ 21 mm.

C. crassipes Ball.

♂. Туловище короткое, довольно толстое, почти параллельное. Голова большая; лобъ плоскій, широко вдавленный посрединѣ, между и передъ усиками, покрытъ очень рѣдкими, довольно крупными точками; затылочные пятна свѣтло-рыжія, такъ-же какъ два небольшихъ

пятнышка на бѣломъ фонѣ между основаніями усиковъ; послѣдніе чернаго цвѣта, тонкіе, короткіе, равняющіеся по длинѣ только $\frac{2}{3}$ туловища; первый членикъ ихъ короткій, только на $\frac{1}{5}$ длиннѣе 3-го.

Переднеспинка довольно выпуклая, особенно въ своей задней трети, нѣсколько болѣе развитая въ ширину по заднему краю (5,5 мм.), чѣмъ въ длину (5 мм.), съ слабо выступающими боковыми буграми, оканчивающимися, по самой срединѣ бокового края, небольшимъ, короткимъ, но острымъ зубчикомъ; три обычныхъ бѣлыхъ полосы узкія; щитокъ болѣе развитый въ длину.

Надкрылья короткія, только въ $2\frac{1}{2}$ раза (13 мм.) длиннѣе переднеспинки, расширенныя кзади и потому представляющіяся почти параллельными; окраинная бѣлая полоска ихъ широкая, съ неровнымъ внутреннимъ краемъ; плечевая такой же ширины, сполна цѣльная и назади сливающаяся съ окраинной; 1-я спинная едва просвѣчиваетъ сквозь общій покровъ, въ видѣ разорванныхъ бѣловатыхъ пятнышекъ: плечевое ребро довольно широкое, но слабо выпуклое, гладкое, покрытое рѣдкимъ пунктиромъ; 1-е спинное — слабо выражено; на блѣдно-рыжемъ покровѣ надкрылій разбросаны отдѣльныя пятнышки болѣе темнаго оттѣнка, мало замѣтныя для невооруженнаго глаза.

Нижняя сторона туловища покрыта грязно-бѣловатыми волосками, брюшко посрединѣ почти голое; отростокъ переднегруди почти вдвое уже среднегрудного. Ноги толстыя, короткія; бедра задней пары одинаковой длины съ голеньями той-же пары, бедра и тарсы чернаго цвѣта, голени буровато-красныя съ широкими черными концами; внѣшняя вырѣзка на голеньяхъ средней пары со щеткой волосъ ярко-рыжаго цвѣта, такого-же цвѣта и подбой тарсовъ съ нижней стороны; тарсы короткіе, два первыхъ членика задней пары ихъ съ лопастями укороченными, тупыми, почти прямо обрѣзанными.

Дл. 20 мм., шир. 8,2 мм.

Иссыкъ-куль (24. VI. 1901. Р ю к б е й л ь!).

Видъ этотъ близокъ къ *C. crassipes* Ball., но хорошо отличается отъ него очень блѣднымъ, рыжеватымъ покровомъ верхней стороны туловища, короткими и очень тонкими усиками, болѣе напоминающими усики самокъ, и строеніемъ двухъ основныхъ члениковъ задней пары тарсовъ.