


CERAMBYX ELBURSI N. SP. PROPE MULTIPLICATUS
MOTSCH. (COL.).

Dr. Štěpán Jureček, Praha.

C. multiplicato Motsch. simillimus, differt statura robustiore, corpore toto supra pubescente, praecipue in elytris pilis densibus griseo-fuscis duris praecipue autem, antennis brevioribus, in ♂ articulis tertio, quarto quintoque brevibus, valde incrassatis, hoc etiam in ♀ manifeste crassiore et abbreviato. (in *C. multiplicato* et *Scopolii* Füssl. antennarum articulus 3. et 4. incrassati sunt.) Prothorax manifeste latior, tarsi posteriores breviores. Long 20—29 mm. Patria: Montes Elburs Persiae bor. (Bodemevr) 10 specimina (7 ♂, 3 ♀).

Velmi podoben *multiplicatus*, liší se něco zavalitějším tělem, pokrytým svrchu šedožlutými, dosti dlouhými, hrubě vlnitými a přilehavými chloupky, zhuštěnými na krovkách tak, že dodávají povrchu olověšedého zbarvení. Nápadným znakem jsou tykadla, kratší nežli u *multiplicatus* i *Scopolii* Füssl., mající u ♂ 3.—5. článek krátký a uzlovitě ztlustělý (u obou jmenovaných jen 3. a 4. jest uzlovitý, kdežto 5. se blíží tvarem i délkou 6.); 3. a 4. je tlustší a kratší než u *multiplicatus*. Též u ♀ je zduření 3.—5. článku patrnější a 5. čl. je od 6. odchylný. Vráskování na týlu hlavy je hustší. Štít je poměrně širší, u předního okraje náhle a více paralelně zaškrncen, takže vzniká po straně před trnem znatelný hrbol. Zadní chodidla kratší a ne tak štíhlá jako u *multiplicatus*.



Antenna sinistra.
1. *Cesamb. Elbursi* n. sp.
2. „ *multiplicatus*
Motsch.

Résumé: Très semblable à *multiplicatus* Motsch., diffère par le corps un peu plus trapu, couvert d'épais poils gris jaunâtre, formant sur les élytres une pilosité assez grossière, crépée, irrégulièrement couchée. Diffère du *multiplicatus* surtout par les antennes, qui sont plus courtes, les articles 3ème — 5ème chez les mâles sont raccourcis et engrossis (les 3—4ème encore plus que chez les espèces ci-citées), et seulement le 6ème a la forme du 5ème des espèces citées. On peut observer la même chose chez les femelles. Rugulation sur le vertex plus serrée, le rétrécissement du bord antérieur du prothorax plus brusque et parallèle. Pattes postérieures plus courtes et pas si minces que chez *multiplicatus*.