

- ß. Statura majori, tuberculis thoracis submucronatis, elytris violaceis, levibus.
-

19. *Leptura pratensis*. Der Wiesen Schmahlböckläfer.

Zweymal auf der Scab. columb. der Wiesen.

Von den kleinern dieser Art: schwarz mit lichtbraunen, an den Seiten dunkelgestreiften Flügeldecken.

Der Kopf schwarz, behaart: Augen und Fresswerkzeuge stark hervorstehend, die Fühlhörner kurz, reichen kaum zur Hälfte der Flügeldecken. Der Brustschild glänzenschwarz, um die Mitte kuglicht, auf der Oberfläche sehr behaart; mit längern graulichten Härchen. Das Schildchen schwarz. Die Flügeldecken lichtbraun; von den äußern Winkeln läuft bis zur Hälfte eine dunkelbraune Linie, die aber den Rand nicht berührt: die Nahe und äußerste Spitze ebenfalls dunkelbraun: die Oberfläche stark gedupst. Die untere Seite und die Füße schwärzlich, mit kurzen grauen Härchen überzogen.

Mit dem Suchglase schief über die Oberfläche der Flügeldecken gesehen, entdeckt man ebenfalls sehr kurze Härchen.

LEPTURA nigra elytris lividis lineola fusca a basi versus medium ad marginem.

Capite toto nigro, subviloso: *oculis* instrumentisque cibariis prominentibus: *Antenn.* subbrevibus.

Thorace nigro nitente viloso; villo cinerascete, in medio subgloboso.

scutello nigro.

Ely-

Elytris lividis, lineola fusca ab angulo
externo ad medium usque protensa:
suturis, *apicibusque* fuscis: superficie
punctata.

Subtus pedibusque nigris, tomentosis; to-
mento cinereo.



Necydalis.

Der Stutzbockkäfer. La Necydale.

Necydalis Linn. Scop. *Leptura* Fabric.

Antenna setaceæ.

Elytra dimidiata.

Femora pedum clavata.

Die Fühlhörner borstenförmig.

Die Flügeldecken halb abgestutzt.

Die Schenkel der Füße keulicht.

I. *Necydalis major*. Der grosse Stutz-
bockkäfer.

Linn. S. N. p. 641. n. 1.

Fabr. S. E. p. 199. n. 18. Sp. I. 1. p. 250. n. 25.

Leptura abbreviata.

Schaff. Icon. tab. 10. fig. 10. 11.

Goeze Beyrr. Coleopt. p. 510. n. 1.

Einmal im Fluge gefangen.

Der Grösste dieser Art: schwärzlich mit rothbrau-
nen Flügeldecken und Füßen.

Der