

»Habita en la Persia meridional (Laristan), en sitios arenosos junto á Bender-Abbas. 10 de Febrero de 1893. Leg. J. Bornmüller.»

—El Sr. Lauffer dió lectura á la siguiente descripción:

«*Dorcadion Bolivari* sp. nov.

»Ovale, elongatum, obscure brunneum; frons, fascia nitida verticis alteraque prothoracis, abdominis apice, antennis articulo primo excepto, coxarum apice, trochanteribus, tibiaram apice nec non tarsis brunneo-rufis; palpis ferrugineis. Caput cinereo-tomentosum, carina media nitida, angustissime sulcata a epistomate usque ad basim verticis ducta, antorsum angustata. Prothorax medio fascia nitida haud sulcata et utrinque spatío calloso levi, lateribus in tuberculum spinosum productus; dorso albo bifasciato. Elytra elongata, nigro-holosericea; sutura, margo externo, fasciaque humerali in maculas plurimas soluta nec non basi puncto intra humerali albidis.

»Variat in ♀ colore cinereo, fascia humerali elytrorum integra.

»Long. 12-17 mm. Patria, Quero; prov. Ciudad-Real.

»Se distingue de las demás especies españolas descritas hasta hoy por el color de las antenas, patas y faja media del protórax, así como por la circunstancia de tener la faja humeral disuelta en muchas pequeñas manchas.

»El ♂ tiene el cuerpo en proporción más estrecho y prolongado que el *D. Martinezi* y de un color obscuro, la frente y con frecuencia la faja lampiña del vértice y del protórax, el extremo del abdomen, las antenas con excepción del primer artejo, el extremo de las coxas, los trocánteres, el extremo de las tibias y los tarsos de un rojo parduzco; los palpos de un rojo orín. La cabeza, con un tomento blanco sumamente ligero, que sólo en la frente llega á ser algo espeso y mezclado de pelos pardos; tiene una costilla longitudinal saliente, brillante y lisa, que se extiende desde el epístoma hasta el final del vértice; muy estrecha en toda la parte anterior, se ensancha esta costilla mucho en el vértice, donde tiene á cada lado una fajita de un tomento ligero y blanco y está surcada en toda su extensión por una línea fina. El protórax, con tubérculos espinosos, algo obtusos, tiene en el medio una faja ancha, brillante y lampiña, sin surco, y á cada lado, entre esta última y

los tubérculos espinosos, una callosidad brillante y lisa. Al lado de la faja media, y también encima del tubérculo, hay una faja bastante estrecha de tomento blanco; el espacio comprendido entre estas dos fajas blancas está cubierto de un tomento negro que con frecuencia desaparece por el frote. En los lados del protórax el tomento blanquecino es tan ligero, que se ve sin dificultad la puntuación medianamente gruesa.

»Los élitros bastante prolongados, con tomento negro aterciopelado; la sutura, el margen y una faja humeral, así como otra apenas indicada, de un blanco muy puro. Las dos últimas están completamente disueltas en pequeñas manchas irregulares.

»La ♀ es del mismo color y dibujo que el ♂, ó el tomento pasa, como sucede con suma frecuencia en las ♀♀ del *D. Martinezi*, á una coloración cenicienta; entonces la faja humeral suele ser normal, no interrumpida y de un blanco sucio. Pero también en este caso se reconoce fácilmente la especie por el color rojo parduzco de la frente, de las costillas de la cabeza y del protórax, de las antenas (con excepción del primer artejo), de las coxas, trocánteres, tarsos y extremo de las tibias.»

—Se dió lectura á la siguiente nota del R. P. B. Merino:

«*Descripción de un helecho nuevo.*

»**Homophyllum** (gen. nov.) (ex græco ὁμων simile et φυλλον folium).

»*Frondebis omnibus subæqualibus pinnatifidis, soriferis: soris indusiatis, duplici serie nervo medio loborum contigua et parallela, collocatis, demum confluentibus; indusio nervum versus soluto.*

»**Homophyllum blechniforme** (sp. nov.)

»*Perenne; radice brevi, crassa, radículas filiformes tomento fusco tectas edente: frondibus elongato-lanceolatis, breviter stipitatis, stipite glabro v. parce squamoso, pinnatifidis; lobis linear-oblongis, planis, approximatis, obtusis: soris plerumque totam loborum superficiem non occupantibus.*

»*Hæc planta, quam non nisi uno in loco reperi, nempe in quodam proclivio umbroso et madido prope oppidum San Juan de Tabagon nomine cognitum, et ab hoc Collegio 8 kilom. circiter distans, magnam similitudinem primo intuitu cum Blechno spicant Roth. præ se fert. In utraque planta sori pari modo dispo-*