

Gadd diff. 27. *Cerambyx nigro nebulosus*, scutello pallido, elytris fusco æneis.

Habitat in Europa.

Nigricans elytris fasciis obsoletis 2, albidis.

cerdo. 39. *C. thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.*

Mouff. inf. 149. f. 2.

Frisch. inf. 13. t. 8.

Scop. carn. 163. Heros.

Habitat in Italia. M. Kähler; in Germania. Forskåhl.

Statura præcedentis; Corpus & artus nigra. Elytra fastigiata, apice pallidiora s. picea. Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis. Minor (an Mas) antennis mediocribus, elytris postice non piceis, qui Scop. carn. 162; non videtur Specie diversus.

aurico- 40. *C. thorace quadrispinoso ater, elytris tæniis geminis
mns. aureis, pedibus pollicis latissimis compressis. Gron. zooph.* 534. t. 16. f. 1. *

Habitat in America meridionali.

Antennæ corpore paulo longiores.

textor. 41. *C. thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris punctatis, antennis mediocribus. Fn. suec.* 656. *

Scop. carn. 164.

Uddm. diff. n. 29. *Cerambyx fordide niger, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.*

Habitat in Europa.

tristis. 42. *C. thorace spinoso niger, elytris fuscis maculis duabus atris, antennis mediocribus.*

Habitat Monspeli in ligno Cupressi. D. Gouan.

Corpus statura C. textoris. Antennæ atræ. Thorax supra fuscescens. Elytrorum macula altera anterior, altera posterior.

fuligina- 43. *C. thorace subspinoso niger, elytris cinerascens, tor. antennis brevioribus.*

Habitat in Germania. P. Forskåhl.

S f

Minor

Cerambycum Larvæ perforant ligna, extrahuntur a Picis.