

minutum, acutum, nigrum. Elytra basi thoracis medio fere duplo latiora, thorace plus quam triplo longiora, intra humeros modice impressa et ab illis versus apicem sensim attenuata, apice oblique truncata, stria suturali profunde impressa; supra minus profunde et crebre punctulata, breviter atro-pilosa, antérie dimidiatim rubra, postérie nigra, in medio nigredinis macula subrotundata rubra, suturam et marginem haud attingente. Pectus nigrum, subtiliter punctatum, dense flavo-sericeum; abdomen itaque punctatum, parcius flavo-pubescent, segmentis 2 — 4 rufis, reliquis nigris. Pedes nigri, femoribus flavo-, tibiis tarsisque atro-pubescentes.

50. GRAMMOPTERA DENTATOFASCIATA Motschulsky. (*)

Oblonga, atra, opaca, griseo-pubescent; capite thoraceque confertissime punctatis, hoc antrorsum conice angustato, lateribus in medio rotundato-dilatato, basi bisinuato, angulis extrorsum prominulis, acutis; elytris oblongo-quadratis, basi apiceque rotundatis, subtiliter punctulatis, nigris, nitidis, in utroque vitta intus arcuata a basi ad medium protensa lunulaque pone medium ad suturam transversa minuta flavis, pedibus fuscis.

Longit. 4 lin. Latit. $1\frac{1}{3}$ lin.

Habitat in Dauria, D. Sedakoff.

Caput elongatum, atrum opacum, confertissime punctatum, collari subito angustato cylindrico; oculis prominulis. Antennae dimidio corpore longiores, nigrae, pubescentes,

(*) M. Motschoulsky rapporte cette espèce au genre ANOPLADERA Mulsant, mais comme elle a les angles postérieurs du prothorax terminés par une épine bien saillante, elle doit plutôt trouver sa place dans le genre GRAMMOPTERA, conformément aux caractères indiqués pour ces deux genres par M. Mulsant.

extrorsum fusco-brunneae. Thorax latitudine sesquilingior, antrorsum conice angustatus, medio lateribus rotundato-dilatatus, basi bisinuatus, angulis extus prominulis, acutiusculis, confertissime punctatus fere granulosus, ater, opacus, tenue griseo-pubescent. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum. Elytra basi thoracis medio duplo latiora, thorace fere quadruplo longiora, humeris subearinatis et apice rotundata, lateribus fere linearia, nigra nitida, hinc inde brunnescentia, parce griseo-pubescentia, subtiliter concinne punctulata; in utroque macula pone basin incipiente, subrotundata, postice acuminata, cum alia lunata ad medium suturae protensa anguste cohaerente, lunulaque postérie, ad initium partis quartae longitudinis quadripartitae, prope suturam, transversa, flavis; praeterea e macula intermedia et lunula postica versus marginem ramulis transversim subtestaceis obsoletis. Corpus subtus subtiliter punctulatum, densius et longius griseo-pubescent. Pedes fuscis, pubescentes, femoribus brunneis.

