

qué ou échancré et parfois épineux; chez plusieurs leur surface est parée d'élégants fascicules de poils. La taille de ces Lamiens est petite ou exigüe: leurs couleurs à la simple vue semblent peu brillantes; mais en examinant de près les dispositions harmonieuses du duvet varié dont la plupart sont revêtus, ils montrent cette richesse admirable dont la nature se plaît souvent à doter les espèces qui paraissent les moins dignes de nos regards.

		GENRES.
Prothorax	moins long que large.	Elytres entières. Prothorax non-tuberculeux. <i>Exocentrus</i> .
		Elytres tronquées obliquement au sommet. Prothorax tuberculeux. <i>Pogonocherus</i> .
	plus long que large. Elytres tronquées obliquement à l'extrémité. Prothorax non-tuberculeux. <i>Stenosoma</i> .	

Genre. *Exocentrus*, EXOCENTRE; inéd.

(ἔξω, en dehors; κέντρον, aiguillon.)

Caractères. Antennes de onze articles; sétacées; ciliées en dessous; parfois peu distinctement annelées. Prothorax court; non tuberculeux en dessus; armé de chaque côté d'une épine plus ou moins recourbée postérieurement. Elytres oblongues, rétrécies vers l'extrémité; ni tronquées, ni épineuses au sommet; non parées en dessus de fascicules de poils. Corps médiocrement convexe.

Cette coupe générique a été indiquée par M. le comte Dejean, sous le nom que j'ai adopté.

1. **E. cinereus**; NOB. Dessus du corps revêtu d'un duvet cendré. Elytres mouchetées de gris et chargées de deux espèces de bandes transversales de la même couleur. Antennes annelées. (pl. 3. fig. 3.)

Long. 10^{mm} (4^l). Larg. 4 1/4^{mm} (1 1/2^l).

Tête aussi large que la partie antérieure du prothorax; pointillée; brune, mais revêtue d'un duvet cendré; profondément convexe entre les antennes, sans ligne sur le front ni sur le vertex. Yeux bruns, très-échancrés. Antennes sétacées; ciliées en dessous; de la longueur du corps; de onze articles; le premier presque ovale, tronqué au sommet, un peu moins long que le suivant, et comme lui couvert d'un duvet cendré à la base et noir au sommet. Prothorax court; un peu arqué en devant, tronqué postérieurement; étroitement bordé au sommet et à la base; armé de chaque côté d'une forte épine

faiblement recourbée en arrière; subconvexe en dessus; marqué de petits points enfoncés; subcaréné; revêtu d'un duvet cendré. Elytres presque une fois aussi larges que le prothorax à sa base; plus larges que ce dernier à l'extrémité de ses épines; quatre fois aussi longues que lui; à fossette humérale passablement prononcée; rectangulaires aux épaules; presque parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, rétrécies ensuite, et arrondies à l'angle extérieur du sommet, entières à l'angle sutural; subconvexes en dessus; ruguleusement ponctuées à la base, ou couvertes dans cette partie de points enfoncés, moins nombreux et moins marqués à la partie opposée; revêtues d'un duvet cendré; parsemées de petites mouchetures grises, plus rapprochées entre elles vers la base et aux deux tiers, où elles forment deux sortes de bandes transversales, dont l'antérieure occupe parfois le tiers de la longueur. Dessous du corps et pieds noirâtres, revêtus d'un duvet cendré. Cuisses rétrécies en pédicule à la base, renflées en massue au delà du milieu. Jambes intermédiaires obliquement tronquées sur l'arête supérieure; parsemées ainsi que les autres, de taches grises ou plus obscures. Premier article des tarses presque une fois aussi long que le troisième.

Je l'ai trouvé au mois de juillet dans les bois de la Grande-Chartreuse.

2. **E. balteatus**; FAB. Dessus du corps, antennes et pieds d'un rouge brun. Prothorax pubescent, armé de chaque côté d'une petite épine recourbée en arrière. Elytres parcimonieusement hérissées de poils noirs; comme poudrées d'un duvet cendré; dénudées latéralement au tiers, et transversalement aux deux tiers de leur longueur. Antennes peu distinctement annelées.

FAB. *Cerambyx balteatus*, Syst. El. t. 2. p. 278. 59. — LINN. *Cerambyx balteus*, Syst. Nat. app. p. 1067. 6. — PANZ. *Cerambyx cernitus*, Faun. Germ. fasc. 48. pl. 17. — SCHRANCK. *Cerambyx pubicornis*, Natur. t. 26. p. 76. 35. — SCHÖNH. Syn. Ins. *Lamia balteata*, t. 3. p. 378. 64. — SERVIL. *Pogonocherus balteatus* Ann. de la Soc. Ent. t. 4. p. 59.

Long. 5 à 7 1/2^{mm} (2 à 3^l). Larg. 3/4 à 2 1/2^{mm} (3/4 à 1^l).

Tout le corps en dessus est rouge brun, mais presque cendré sur les élytres par l'effet du duvet dont il est garni. Tête aussi large que la partie antérieure du prothorax; d'un rouge brun; pointillée; garnie de poils couchés cendrés grisâtres; hérissée de poils noirs et raides; bombée sur le front; faiblement déprimée entre les antennes; creusée longitudinalement depuis le vertex jusqu'à l'épistome, d'une ligne peu profonde. Yeux noirs, très-échancrés. Antennes sétacées; un peu plus longues que le corps; ciliées en dessous; de onze articles: le