Genre *Albana*, ALBANE.

(*Albana*, nom mythologique.)

CARACTÈRES. *Antennes* un peu épaisses ; rétrécies de la base à l'extrémité ; aussi longues (♂) ou presque aussi longues que le corps (♀); annelées ; peu ou point ciliées en dessous ; de onze articles : le premier presque uniformément épais, moins grand que le troisième, plus allongé que le quatrième. *Tête* longitudinalement sillonnée sur le front. *Yeux* très-profondément échancrés, presque divisés en deux parties. *Prothorax* subcylindrique, court. *Ecusson* en demi-cercle moins long que large. *Elytres* subparallèles, arrondies à l'extrémité, faiblement ou médiocrement convexes en dessus, subperpendiculairement déclives sur les côtés et d'une manière graduellement affaiblie des épaules à l'extrémité. *Pieds* assez forts, peu allongés.

Obs. Cette coupe qui doit trouver place dans la branche des Mesosaires, sert à lier le genre *Mesosa* au genre *Niphona*. Elle diffère du premier par ses antennes épaisses, non ciliées en dessous ; du second, par ses élytres arrondies à l'extrémité.

M. grisea ; FOUDRAS, inéd. *Assez allongée ; médiocrement convexe et revêtue d'un duvet gris cendré, légèrement teinté de fauve. Elytres parées, dans leur seconde moitié, d'une* M *d'un blanc cendré, commune aux deux étuis, à branches externes obliques et bordées d'une raie noire.*

♂. Le ♂ que je n'ai pas vu a probablement les antennes aussi longues que le corps et l'hypopygium entier.

♀ Antennes prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur des élytres. Hypopygium creusé d'une dépression sulciforme paraissant entaillée à son extrémité.

Long. 0^{m},0067 (3^{l}). — Larg. 0^{m},0033 (2 1/3^{l}).

Corps assez allongé ; médiocrement convexe sur le dos ; revêtu d'un duvet épais. *Tête* inclinée ; noire, mais revêtue d'un duvet épais d'un gris cendré, mélangé de quelques parties tirant un peu sur le fauve ; creusée longitudinalement depuis le vertex d'un sillon assez profond entre les yeux et graduellement affaibli eu approchant de l'épistome : côtés de ce sillon subtuberculeux à la base des antennes. *Yeux* noirs. *Antennes* prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur du

corps (♀) ; à articles annelés ; c'est-à-dire garnies d'un duvet cendré dans leur première moitié, brun dans la seconde. *Prothorax* à peine plus large en devant que la tête qu'il embrasse ; tronqué à son bord antérieur ; subcylindrique ou à peine arqué sur les côtés ; bissubsinueusement tronqué à la base ; moins long que large ; revêtu d'un duvet gris cendré ou d'un gris cendré légèrement fauve, offrant longitudinalement dans son milieu une raie d'un blanc cendré peu tranché, couronné antérieurement par une ligne transversale brune, assez courte ; marqué de chaque côté de la ligne médiaire de trois ou quatre points de même couleur, peu tranchés et irrégulièrement disposés. *Ecusson* revêtu d'un duvet gris cendré. *Elytres* d'un quart ou d'un tiers plus larges en devant que le prothorax à sa partie postérieure ; quatre fois à peu près aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, arrondies à l'extrémité ; médiocrement convexes sur le dos ; à fossette humérale peu profonde ; noires ou brunes, mais revêtues d'un duvet épais ; parsemées de points enfoncés progressivement moins gros de la base à l'extrémité, mais laissant un vide ou apparaissant comme de petites mouchetures brunes sur le duvet : celui-ci en majeure partie d'un gris cendré ou d'un gris cendré légèrement teinté de fauve, offrant sur les deux tiers internes de la moitié antérieure de chaque élytre, une teinte d'un blanc cendré peu uniforme, rendant plus apparents trois à quatre points bruns, longitudinalement disposés sur une trace enfumée ; parées, de la moitié aux trois quarts de la longueur, d'une sorte d'M d'un blanc cendré, commune aux deux étuis, dont la branche externe sensiblement oblique de dedans en dehors est bordée au côté interne d'une raie noire. *Dessous du corps* et *Pieds* d'un gris cendré : ceux-ci assez courts et épais.

Cette espèce a été découverte par M. Foudras, dans les garrigues des environs de Saint-Georges, près Montpellier. Elle se trouvait sur le *Cistus Monspeliensis* ; mais peut-être à l'état de larve vit-elle aux dépens d'une autre plante.