

avec la base noire ; genoux des postérieures également noirs : jambes antérieures d'un rouge jaune ; les autres et tous les tarses , noirs , revêtus d'un duvet gris cendré : jambes intermédiaires échancrées sur l'arête supérieure. *Ongles* bifides, ou armés d'une forte dent vers le milieu de la longueur.

Patrie : l'Espagne.

Obs. Cette espèce m'a été envoyée par M. Jules Lederer naturaliste de Vienne (Autriche) à qui je l'ai dédiée. Je n'ai vu que le ♂.

Phytœcla tigrina.

Dessus du corps d'un noir gris , garni de mouchetures d'un blanc légèrement ardoisé : partie postérieure de la tête et prothorax ornés d'une bande longitudinale médiane formée d'un duvet semblable. Dessous du corps revêtu d'un duvet pareil ; ponctué de brun.

♂. Segment anal creusé d'une fossette.

Long. 0^m,0090 (4 l.) Larg. 0^m,0028 (1 1/4 l.)

Tête bombée en devant ; ponctué ; revêtu à sa partie antérieure d'un duvet cendré flavescent ; ornée sur le milieu de sa partie postérieure d'une ligne longitudinale , formée d'un duvet blanc légèrement ardoisé ; parée autour des yeux d'une bordure d'un duvet semblable ; hérissée de poils obscurs longs et clairsemés. *Yeux* bruns noirs ; très-profondément échancrés. *Antennes* prolongées jusqu'aux trois-quarts environ de la longueur du corps ; de onze articles : le premier, renflé ; le deuxième, petit, subglobuleux : les suivants , subfiliformes : le troisième au moins aussi long que le premier et un peu plus que le quatrième ; revêtues d'un duvet blanc légèrement ardoisé ; annelées de brun , en dessus , dans la seconde moitié de presque tous les articles et dans la moitié médiane du dernier. *Prothorax* d'un quart ou d'un cinquième moins long que large ; tronqué en ligne droite ou à peine arquée , en devant ; très subsinueusement tronqué à la base ; médiocrement arrondi sur les côtés ; grossièrement ponctué ; noir ou d'un noir gris , parsemé de mouchetures d'un blanc légèrement

ardoisé ; chargé longitudinalement sur son milieu d'une bande étroite ou sublinéaire formée par un duvet serré, de même couleur ; hérissé de poils obscurs longs et clairsemés. *Ecusson* revêtu d'un duvet blanc cendré sur sa moitié antérieure , d'un noir gris et presque glabre sur sa moitié postérieure. *Elytres* d'un tiers plus larges en devant que le prothorax à sa base ; d'un quart ou d'un cinquième plus larges que ce dernier dans son diamètre transversal le plus grand ; quatre à cinq fois aussi longues que lui ; rétrécies presque uniformément jusqu'aux quatre cinquièmes et plus sensiblement à partir de ce point ; obliquement tronquées chacune à l'extrémité , en formant à la suture un angle rentrant ; presque planes en dessus ; assez brusquement rabattues sur les côtés vers l'angle huméral et d'une manière graduellement affaiblie postérieurement ; aspèremment ponctué et, par là, paraissant presque granuleuses ; noires ou d'un noir gris ; mouchetées d'un duvet d'un blanc légèrement ardoisé ; presque glabres, ou garnies sur les intervalles existants entre ces mouchetures de poils noirs ou obscurs , grossiers et couchés. *Dessous du corps et pieds* revêtus d'un duvet blanc légèrement bleuâtre ou ardoisé ; ponctué de brun noir. Jambes intermédiaires obliquement échancrées sur l'arête externe. Crochets des tarses ferrugineux ; munis chacun d'une dent interne à la base de leurs branches.

Patrie : les environs de Grasse (Var.)

Je n'ai vu que le ♂.

Notes recueillies à Londres dans l'examen de la collection de Linné , pour servir à la synonymie de divers Longicornes.

Cerambyx cerdo. L'espèce typique décrite sous ce nom est bien le *C. heros* de Scopoli , comme l'indique l'ouvrage synonymique de Schönherr. Sous la même dénomination se trouvent deux exemplaires du *C. cerdo*, considérés par Linné comme une variété plus petite, ou dubitativement comme le ♂ de l'espèce.