

au-devant des plis transversaux de la base, ordinairement triangulaire et entièrement gaufrée, tandis que chez le *heros*, cette partie est graduellement sillonnée et déprimée. 4° par la forme de l'extrémité des élytres, beaucoup plus sensiblement tronquée, de manière à offrir un angle peu émoussé à la partie externe de cette troncature, tandis que chez le *C. heros*, le côté externe est subarrondi; par la troncature plus sensiblement oblique d'arrière en avant, de dehors en dedans; par l'épine dont l'angle sutural est armé, plus longue. Ces caractères tirés de l'extrémité des élytres et des reliefs du prothorax, donnent au *C. Manderstjernæ* un faciès qui frappe au premier coup d'œil.

Leptura saucia.

Allongée; noire, hérissée de poils cendrés. Prothorax arrondi sur les côtés jusqu'aux deux cinquièmes, subparallèle ou légèrement sinué ensuite; déprimé ou sillonné au-devant de la base et après le bord antérieur; ponctué. Elytres rétrécies à partir de l'épaule, arrondies chacune à l'extrémité; ornées chacune d'une tache d'un rouge testacé livide, peu nettement limitée, prolongée depuis l'épaule presque jusqu'aux deux cinquièmes, étendue jusqu'à la moitié, rétrécie d'arrière en avant, depuis ce point jusqu'au calus huméral.

Long. 0,0112 (5 l.). — Larg. 4,0033 (1 1/2 l.).

Corps allongé. Tête noire; densément ponctué; hérissée de poils cendrés, surtout derrière les yeux; brusquement rétrécie après ces organes; peu profondément sillonnée sur la suture frontale. Yeux échancrés à leur côté interne. Antennes insérées à l'extrémité antérieure de l'échancrure des yeux; prolongées jusqu'aux trois quarts environ du corps; subfiliformes, faiblement plus grosses et plus soyeuses à partir du septième article; noires, luisantes et garnies de quelques poils fauves sur les six premiers articles, d'un noir brun mat sur les derniers. Prothorax tronqué en avant; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes,

mes, subparallèle ensuite ou plutôt légèrement sinué entre le milieu et les angles postérieurs; tronqué à la base; transversalement déprimé ou sillonné au-devant de celle-ci et après le bord antérieur; convexe; noir; marqué de points plus gros que ceux de la tête; hérissé de longs poils cendrés; offrant sur la ligne médiane les traces légères d'un sillon longitudinal étroit. Ecusson en triangle subéquilatéral; noir; ponctué; hérissé de poils cendrés. Elytres de deux cinquièmes plus larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois à trois fois et demie aussi longues que lui; émoussées ou subarrondies aux épaules; graduellement rétrécies ensuite jusque vers l'extrémité, subarrondies chacune à celle-ci; rebordées latéralement; presque planes sur le dos, perpendiculairement déclives sur le côté des épaules, puis graduellement d'une manière convexe; creusées d'une fossette humérale; ponctuées d'une manière un peu ruguleuse, moins dense et moins profonde que le prothorax; noires ou d'un noir légèrement bleuâtre; ornées chacune d'une tache d'un rouge testacé livide, peu nettement limitée, prolongée sur le bord externe presque depuis l'épaule jusqu'au tiers ou presque aux deux cinquièmes de la longueur, étendue à sa partie postérieure, environ jusqu'à la moitié de la largeur de chaque étui, rétrécie d'arrière en avant depuis ce point jusqu'au calus huméral. Dessous du corps et pieds noirs; hérissés de poils cendrés ou cendrés flavescents.

Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levillant.