

Elle ressemble à la Saperde cylindrique, mais elle est une fois plus grande. Le corps est allongé, étroit, cylindrique et noir. Les antennes sont de longueur médiocre. Les antennules sont roussâtres. Le front est convexe, ponctué, velu, avec un léger sillon au milieu, dans sa longueur. Le corcelet est un peu chagriné et un peu velu, plus luisant sur le milieu du dos. Les élytres sont fort allongées, resserrées vers leur milieu, tronquées obliquement à leur extrémité, pointillées : les points sont très-rapprochés et à stries confuses. Le bord extérieur de la base des élytres et les pattes sont roussâtres. L'abdomen est obtus et se recourbe un peu en dessous.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, plus communément sur le Coudrier.

28. SAPERDE rufipède.

*SAPERDA rufipes*. Pl. 2. fig. 14.

S. d'un noir cendré ; cuisses, jambes antérieures et extrémité de l'abdomen roussâtres.

S. cinereo-nigra, femoribus, tibiis anticis anoque rufescentibus.

S. virescente paulò minor, cinereo-nigra, subtiliter punctata. Caput, thorax pectusque griseo-villosa. Elytra versùs apicem angustata, oblique truncata. Femora, tibiæ anticæ, abdominis apex, rufescentia.

Elle est un peu plus petite que la Saperde verdâtre, d'un noir cendré et finement ponctuée. La tête, le corcelet et la poitrine ont des poils gris. Les élytres se rétrécissent vers leur extrémité, qui est tronquée obliquement. Les cuisses, les jambes antérieures et l'anus sont roussâtres.

Elle se trouve dans le département du Var.

29. SAPERDE Lynx.

*SAPERDA lyncea*. Pl. 4. fig. 44.

S. noirâtre, presque bronzée ; élytres terminées en pointe ; abdomen avec une rangée de points fauves de chaque côté.

S. nigra, elytris fuscis acuminatis, abdomine maculis lateralibus fulvis.

Saperda thorace atro, puncto utrinque ferrugineo, elytris griseis, acumi-