

VI. CER. *Fennicus thorace spinoso, niger pube grisecente, elytris cylindricis, postice laevibus, fascia media apiceque subferrugineis.*

*Habitat in Finlandia.*

*Caput nigrum, griseo-pubescent; antennæ corpore dimidio breviores articulis basi cinerascentibus. Thorax niger pube grisecente, subdepressus, longitudine dimidio lator, dente valido utrinque lateral. Scutellum nigrum pube grisecente, postice rotundatum. Elytra thorace latiora & latitudine plus duplo longiora, cylindrica, parum convexa, antice & in medio profunde punctulata, postice laevia rotundata; nigra, griseo-pubescentia: fascia media angustata inæquali obsoleta, vix marginem vel suturam attingente apiceque late subferrugineis griseo-pubescentibus, punctis plurimis nigris temere sparsis. Alæ fusco-hyalinæ. Pectus, Abdomen & Pedes nigra, griseo-pubescentia. Latitudo vix Cer. Punctulati sed paulo longior.*

OBS. Differt a præcedentibus, quibus affinis, colore, corpore magis oblongo, elytrisque cylindricis postice impunctatis.

VII. CER. *Fasciculatus brunneus, pubescens, thorace spinoso, elytris integris albo-fasciatis: punctis plurimis fasciculisque tribus nigris.*

FABR. *Ent. Syst. I. p. 2. p. 262. 39. Cer. fasciculatus.*

DE GEER. *Ins. 5. p. 71. 9. t. 3. f. 17. Cer. fasciculatus.*

Ha-