

peu près le dessin des ♀ et présente tout le milieu des élytres rouge, elle a de noir deux taches plus ou moins triangulaires dirigées en dedans, l'une aux épaules, l'autre à l'extrémité. La tache antérieure du ♂ est quelquefois un peu dentée. Cette espèce est facile à distinguer des autres par ses antennes très courtes ♂ ♀, son prothorax bien arrondi et globuleux, muni sur les côtés d'une très petite épine.

Le *Pur. Desfontainesi* F. présente au prothorax des taches noires assez variables, plus ou moins grossies ; à Lambessa (Algérie) on trouve même une race à prothorax presque entièrement noir, n'offrant que deux ou trois taches rouges. Cette espèce a sur les épaules tantôt une bande ou des taches noires plus ou moins étendues (type), tantôt les épaules rouges (v.) (*inhumeralis*). J'ai la (v.) *inhumeralis* d'Asie mineure. Je ne crois pas que la tache apicale chez cette espèce se modifie beaucoup.

### **Calchaenesthes** Kraatz.

L. *C. oblongomaculata* Guer. offre sur fond rouge jaune deux (type), ou trois, taches (v.) (*sexmaculata* Guer.) noires sur chaque élytre, ces taches plus ou moins élargies, les antérieures très grosses plus ou moins réunies sur la suture. La (v.) *sexmaculata* paraît propre surtout aux ♀.

### **Plagionotus** Muls.

*Pl. detritus* L. — Espèce un peu variable, offrant les bandes postérieures jaunes plus ou moins réunies sur la suture, les deux dernières rarement fondues en une seule ; les bandes prothoraciques sont aussi plus ou moins larges ou divisées, le prothorax est noir ou brunâtre.

Elytres tantôt à fond noir brun (type), tantôt à fond brun rougeâtre plus ou moins clair (v.) (*rufescens*). Quelquefois aux épaules les élytres sont étroitement rougeâtres chez le type.

Je considère le *Plagionotus siculus* Cast. comme une v. du *scalaris* Brul., de taille plus petite avec les bandes plus grêles et les pattes plus foncées. Le *scalaris* présente rarement la bande médiane prothoracique interrompue.

*Pl. arcuatus* L. — Bande médiane prothoracique souvent interrompue, toujours au moins un peu rétrécie dans son milieu. Deux points jaunes sur chaque élytre dont l'un commun sur la suture et trois fascies avec l'extrémité