

antennes et pattes plus ou moins roussâtres, ces organes robustes. Antennes un peu roussâtres, à peu près de la longueur du corps, 3^{me} article très long, plus long que 1^{er} et surtout que 4^{me}; prothorax pas très long, à angles postérieurs modérément saillants, ne couvrant pas les épaules, sinué sur les côtés, peu atténué antérieurement; élytres pas très longs, modérément atténués à l'extrémité où ils sont obliquement tronqués; pattes roussâtres, les cuisses étant un peu plus foncées; dessous du corps noir. Long. 8 mill. — Thoisy (ex coll. Tournier). — Était confondue dans la coll. Tournier avec *S. melanura* L., mais en est bien distinct par la forme moins allongée, les tibias épaissis, la coloration des membres.

Typocerus attenuata L. v. **obscuriventris**. Elytres à fascies noires très larges, sans macule ou avec une macule jaune antéapicale peu distincte; abdomen entièrement noir. — Sibérie (coll. Pic).

Dans son étude synoptique sur les *Strangalia* près *melanura* L. et *bifasciata* Müll. (*Wiener Ent. Z.*, avril 1901, p. 77 à 80), M. E. Reitter n'a pas mentionné *hecate* Reitt. v. *auliensis* Pic, récemment décrite (*Echange*, n° 195, mars 1901, p. 19), ni *melanura* L. v. *latesuturata* Pic (*Mat. Long.*, I, p. 63) dont la v. *rubellata* Reitter, d'après la description, paraît synonyme. — *Strangalia Jægeri* Fairm., nec Hum. (*An. Fr.*, 1866, p. 279), est une variété de *emmipoda* Muls. qui pourra prendre le nom de *subsignata*.

Alosterna tabacicolor Deg. var. **tokatensis**. Noir avec les élytres (ceux-ci faiblement rembrunis sur la suture), les pattes, moins une partie des tarsi, et l'extrémité de l'abdomen testacés. — Tokat. Reçu de M. Donckier. — Distinct par le 1^{er} article des antennes foncé, les élytres à coloration générale testacée, sans macule apicale foncée.

Anaglyptus obscurissimus. Niger, thorace in disco distincte carinato; antennis simplicibus; elytris griseo fasciatis aut maculatis et apice indistincte truncatis. Long. 13 mill. — Tokat (coll. Pic). — De coloration et fascies analogue à *mysticus* L. v. *hieroglyphicus* Herbst., mais dessin élytral pubescent un peu jaunâtre, formé sur le milieu des élytres d'une fascie oblique et d'une large macule suturale irrégulière, prothorax à carène basale distincte, etc. Peut être variété foncée de *A. mysticoides* Reitt. (*W.*, 1894, p. 128)?

Prasocuris distincta Luc. v. **pallidithorax**. Prothorax presque entièrement testacé, par suite de l'oblitération de la bande discale foncée de la forme type; bordure latérale des élytres peu marquée. Long. 4 mill. — Tunisie.

M. Pic.

NOUVELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES FRANÇAIS

PAR ELZÉAR ABEILLE DE PERRIN

I. — ANACÆNA IMMATURA

Long. 2 à 2 1/2 mill.

Le genre *Anacæna* est composé d'espèces d'aspect et de caractères divers qui le scindent en plusieurs groupes. Tantôt nous constatons un mésosternum sans crête, ni carène, tel que chez *ovata* Reich, type des vrais *Anacæna*. Ajoutons, entre parenthèses, que le *G. Brachypalpus* ne peut être aucunement considéré comme synonyme de ce genre, contrairement à l'opinion de Rey, puisque Castelnau place en tête de son genre le