

# L'Échange, Revue Linnéenne

## LONGICORNES PALÉARCTIQUES NOUVEAUX

**Obrium obscuripenne.** — Modérément allongé, très brillant, éparsément pubescent de gris, entièrement d'un brun obscurci avec l'avant-corps un peu plus foncé. Antennes rousses ; prothorax éparsément ponctué, plus long que large, tuberculé sur les côtés et subcaréné au milieu en arrière, étranglé à la base ; élytres assez larges, obliquement impressionnés antérieurement, à ponctuation forte et espacée ; pattes rousses avec les cuisses rembrunies. Long. 5 mm. — Un exemplaire de Sibérie dans ma collection. — Distinct de *cantharinum* L. au moins par sa coloration foncée ; peut être simple variété de cette espèce, ce que démontrera la capture ultérieure d'autres exemplaires.

**Dorcadion terolense** Esc. var. **Georgei.** — Pattes et antennes rouges, bandes dénudées larges. Espagne, reçu de M. G. Schramm.

**Dorcadion granulosum.** — Assez allongé, noir, en grande partie revêtu de pubescence fauve et orné de bandes grisâtres. Tête présentant sur le vertex deux carènes brillantes séparées par un profond sillon ; prothorax peu large et assez court, plus étroit à la base, à gibbosité latérale peu prononcée, orné de deux carènes lisses assez larges, séparées par un profond sillon, le milieu du disque est légèrement creusé, pubescent de jaunâtre et cet organe est densément et irrégulièrement ponctué-granuleux ; écusson foncé et brillant, étroitement bordé de pubescence grisâtre ; élytres assez longs, plus diminués en avant qu'en arrière, subarrondis séparément au sommet, marqués antérieurement de granules lisses plus ou moins nombreuses, un peu glabres sur le milieu du disque, et sur le reste revêtus d'une pubescence légèrement fauve et ornés d'une large bordure suturale, d'une étroite bordure externe, d'une large bande humérale complète celles-ci blanches, un petit trait de même pubescence à la base, entre les bandes suturale et dorsale ♀ ; pattes foncées. Long. 12 mm. Espagne (de la coll. Tournier). A placer près de *Dejeani* Chevr.

**Phytoecia infernalis.** — Assez large, brillant, entièrement noir, finement pubescent de fauve et orné de longs poils foncés dressés. Tête large, sillonnée sur le vertex, à ponctuation forte et espacée ; antennes assez grêles, ne dépassant pas ♀, ou un peu ♂, le corps, foncées avec les articles d'ordinaire annelés de gris à la base, le 3<sup>e</sup> article très long, plus long que le 4<sup>e</sup> ; prothorax court et assez large, un peu rétréci aux deux extrémités, convexe, à ponctuation très forte et rapprochée ; écusson glabre, large ; élytres larges, peu longs, modérément rétrécis à l'extrémité chez ♂, ou à peine ♀, subarrondis séparément au sommet, à ponctuation peu écartée, forte à la base, presque effacée au sommet ; pattes assez fortes, noires ; pygidium court, bordé de poils fauves. Long. 10-12 mill. — Plusieurs exemplaires recueillis en Sibérie sur les rives de l'Amour par M<sup>me</sup> R. Korb et faisant partie de ma collection. — Espèce bien distincte par sa coloration entièrement foncée jointe à sa forme robuste. Peut se placer dans le voisinage de *millefolii* Adams.

**Oberea Rosinæ.** — Modérément allongé, presque mat, coloration analogue à *vittata*

Blessig, sauf que le prothorax est largement maculé de noir et le pygidium testacé. Tête moyenne, sillonnée sur le vertex, pas plus large que le prothorax ; antennes noires, à peu près de la longueur du corps ; prothorax testacé, assez court, orné d'une large bande noire postérieure irrégulière et plus ou moins dilatée ou prolongée en avant sur les côtés, et surtout sur le milieu ; élytres légèrement déprimés, subtronqués au sommet, à côte humérale distincte, ornés d'une longue bande discale testacée et d'une longue macule infra-humérale de même couleur ; poitrine et milieu des premiers segments de l'abdomen noirs, le reste testacé. Long. 12-14 mm. — Même origine que le précédent et capturé à Radde. — Peut être variété de *depressa* Gebl. qui ne m'est connu que par la description.

Je possède, venant de Sibérie, deux *Clytus*, voisins de *nigritulus* Kr., qui sont décrits dans mes « Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, cahier V » devant paraître prochainement, je les signale ici brièvement : — *fulvohirsutus*. Noir, hérissé de poils fauves avec les membres entièrement testacés, les élytres ornés de deux fascies (ante et postmédianes) arquées en avant, et d'une bordure apicale, celles-ci jaunâtres. — *raddensis*. Noir brillant avec les membres roussâtres ou rembrunis, les élytres subtronqués, ornés de 2 fascies blanches, la 1<sup>re</sup> très oblique et remontant en avant, la 2<sup>e</sup> sinuée, placée après le milieu.

M. Pic.

## DIAGNOSES DE SEIZE COLÉOPTÈRES EXOTIQUES

### APPARTENANT A DIVERSES FAMILLES

**Ozognathus inarmatus.** — Latus, nitidus, fulvo et subhirsuto pubescens, antennis pedibusque rufo-testaceis (femoribus aliquot brunneis), thorace lateraliter arcuato et crenulato, angulis posticis mediocris, elytris minutissime punctatis, lateraliter subhumeris carinatis. Long. 2,5-3 mm. Chili. — Plus robuste que *O. cornutus* Lec. avec le prothorax différent.

**Ozognathus rufescens.** — Satis latus, nitidus, brevissime pubescens, rufescens, oculis et subtus corpore nigris ; thorace lateraliter arcuato et crenulato, angulis posticis subrotundatis, elytris mediocriter punctatis, lateraliter subhumeris carinatis. Long. 2,3 mm. Chili. — Moins large que *inarmatus* et coloration différente.

**Thaptor sublineatus.** — Modice elongatus, nitidus, rufus, fulvo pubescens (pubescentia elytrorum pro parte in lineis parum distinctis disposita), thorace breve, anterieus sat modice attenuato, angulis anticis distinctis, elytris parallelis, ad apicem modice attenuatis, lateraliter bistriatis. Long. 2,5-3 mm. Chili. — Voisin de *suturalis* Pic, très distinct par la disposition de sa pubescence, en partie disposée en lignes longitudinales.

**Thaptor australiensis.** — Elongatus, nitidissimus, rufescens, elytris nigrescentibus, ad apicem et lateraliter rufis, thorace paulum breve, anterieus distincte attenuato, elytris elongatis, apice modice attenuatis, lateraliter bistriatis, striis fere integris. Long. 3 mm. Australie.

**Thaptor mexicanus.** — Elongatus, subopacus, rufo-brunneus sat dense fulvo pubescens, thorace paulum breve, anterieus distincte attenuato, elytris elongatis, apice