Vingt-deuxième année. N° 254 Février 1906.

L'Échange, Revue Linnéenne

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES
D'EUROPE, ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE (1)

Par M. PIC. — (*Suite.*)

Dasycerus ionicus Reitt., var. **italica.** — Diffère de *ionicus* Reitt. (co-types de ma collection) principalement par la forme plus trapue, les élytres à ponctuation plus forte et plus distincte. L., 2 mm. Italie méridionale : Sta-Euphemia d'Aspromonte en Calabre (ex Paganetti). — Les épaules sont plus ou moins saillantes chez les divers insectes examinés.

Hadrotoma corticalis Eich., var. **semilimbata.** — Foncé, avec le pourtour externe des élytres et une étroite bordure suturale postérieure roussâtres, tibias et tarses roux. Grèce : Sudena en Morée (ex Holtz).

Phænopterus græcus Pic, var. **rufithorax.** — Diffère des *types* de *græcus* Pic par le prothorax presque droit sur les côtés, cet organe étant en outre entièrement testacé-rougeâtre, et par les élytres presque entièrement foncés (ces organes sont étroitement marqués de testacé à la base et sur une partie des épipleures). Long., 4,5 mill. Grèce : Taygetos en Morée.

Maronius (2) **pulcher.** — Assez allongé, très brillant, presque glabre, bicolore, en partie noir, en partie d'un rouge testacé ; tête noire, creusée sur le front, avec les yeux, un peu plus large que le prothorax ; antennes grêles, longues, noires avec les premiers articles en partie et les trois derniers flaves ; prothorax testacé-rougeâtre, court et large, impressionné sur le disque, un peu rétréci vers le milieu, sinué et rebordé à la base avec tous les angles arrondis ; écusson testacé-rougeâtre, tronqué au sommet ; élytres noirs avec le tiers apical testacé-rougeâtre, relativement longs quoique raccourcis et plus de moitié plus courts que l'abdomen, déhiscents, un peu plus larges que le prothorax à la base, rétrécis avant l'extrémité, séparément arrondis au sommet, impressionnés et carénés en dessus ; ailes noirâtres, de la longueur de l'abdomen (ou un peu plus longues) ; dessous du corps testacé-rougeâtre avec l'extrémité de l'abdomen noir, dernier arceau ventral cupuliforme chez ♂ ; pattes longues et grêles, noires avec la base des cuisses plus ou moins flave. Long. 8 à 9 mm. Pérou : Rio Mixiollo (ex Baer). — Jolie espèce, bien distincte par sa coloration.

Maronius limbatus. — ♀. Modérément allongé, peu brillant, nettement pubescent de gris, bicolore, en partie noir en partie flave ; tête flave sauf le vertex noir, avec les yeux pas plus larges que le prothorax, non creusée ; antennes assez courtes, noires avec les 3 premiers articles flaves ; prothorax flave, obscurci sur le disque, à peine

(1) Tous les types des nouveautés décrites ici se trouvent dans ma collection.

(2) Le genre *Maronius* Gorhan, voisin de *Trypherus* Lec, a le dernier segment de l'abdomen chez ♂ en forme de cupule, à peu près conformé comme chez les *Progeutes* ; ses péritrèmes sont saillants sur les côtés de l'abdomen. Mon intention est de publier prochainement une étude synoptique sur ces insectes et, à cette intention, je sollicite des communications.

impressionné en dessus, en carré long, faiblement diminué en avant, sinué et rebordé à la base ; écusson en partie foncé, tronqué et flave au sommet ; élytres flaves sur leur pourtour, foncés sur le disque, courts et déhiscents, sans côte ni impression discales nettes, subacuminés et subarrondis au sommet ; ailes noirâtres, de la longueur de l'abdomen ; dessous du corps foncé ; pattes un peu robustes, les 4 antérieures presque entièrement flaves, les postérieures foncées. Long. 6 mm. République Argentine : Tucuman (ex Baer). — Ne connaissant pas le ♂ de cette espèce je ne suis pas certain qu'elle doive rentrer réellement dans ce genre (1) ; dans tous les cas cette nouveauté est bien distincte par son système de coloration et la structure des élytres.

Maronius monstrosicornis. — Modérément allongé, peu brillant, pubescent de gris, en partie testacé ; tête noire, creusée sur le front, avec les yeux un peu plus large que le prothorax ; antennes assez longues, particulières avec les 4 premiers articles plus ou moins foncés en dessus et allongés, les suivants flaves aplatis et plus ou moins élargis avec le dernier un peu plus étroit que le précédent, 1er long et un peu épais, creusé en dessous, les 3 suivants subcylindriques de plus en plus longs, le 4e étant plus large ; prothorax testacé, en carré long, subarqué sur les bords antérieur et postérieur et un peu rétréci au milieu sur les côtés, impressionné sur le disque ; écusson testacé ; élytres noirs à macule apicale testacée, déhiscents, assez courts, à peine plus larges que le prothorax à la base, subacuminé-arrondis au sommet, sans impression discale nette, mais à faible côte dorsale ; ailes foncées, un peu plus longues que l'abdomen ; dessous du corps testacé avec l'extrémité de l'abdomen en partie rembruni, dernier arceau ventral ♂ cupuliforme ; pattes longues et grêles, testacées avec l'extrémité des cuisses postérieures, aussi parfois le sommet des intermédiaires, noirâtres. Long. 7 mm. Amazones dans l'Amérique Mle. — La structure particulière des antennes fera, à première vue, reconnaître cette espèce.

Je possède encore en collection, sous le nom de *amazonicus* et provenant de Fonteboa (Amazones), deux exemplaires ayant la coloration et l'aspect général de *monstrosicornis*, mais avec les antennes à articles 5e et suivants aplatis sans être élargis, le terminal étroit et très long presque en pointe, ces organes étant en outre plus foncés avec les 4 derniers articles testacés, le dessous du corps est en grande partie foncé ainsi que les pattes postérieures.

Je possède également, sous le nom de *brasiliensis* et provenant de Caraca (Brésil), deux exemplaires à coloration analogue mais avec le prothorax plus court, les antennes plus grêles, foncées avec la base testacée, les élytres peu distinctement et étroitement marqués de testacé au sommet. Je reparlerai ultérieurement de ces divers insectes.

Attalus alaiensis. — ♀. Assez grand et large, brillant à pubescence grise ou obscure courte et en partie redressée, en dessous foncé, en dessus en majeure partie testacé-rougeâtre avec les élytres maculés de foncé ; tête noire, testacée en avant des yeux ; antennes assez grêles, dépassant peu la base du prothorax, foncées avec les premiers articles testacés ; prothorax transverse, plus large que la tête, un peu diminué à la base, entièrement testacé ; écusson foncé ; élytres plus larges que le prothorax à la base,

(1) On pourrait établir dans ce groupe des genres nouveaux, et peut-être le ferai-je plus tard, ayant en main un matériel d'étude plus important ; pour le moment, je crois prématuré, et aussi inutile de le faire, car le petit nombre des espèces alors connues permet de les séparer facilement.

élargis après le milieu, ayant une trace de dépression présuturale derrière l'écusson, finement et irrégulièrement ponctués, ornés d'une bande basale subtriangulaire commune et d'une large macule postmédiane-isolée, celles-ci d'un noir bleuté ; dessous du corps foncé ; pattes grêles, testacées avec la base de toutes les cuisses et la majeure partie des tibias postérieurs foncées, ces derniers un peu arqués. L. 4 mm. Turkestan : Monts Alai (ex Korb). — Serait voisin de *histryx* Ab. (ex description) mais bien distinct par l'absence de tache foncée apicale, la tête non entièrement foncée ; doit rappeler aussi, par sa coloration, *Ebæus oculifer* Ab.

Donaldia minuta. — Court et large, convexe, un peu brillant, orné d'une pubescence en partie claire assez courte et mi-soulevée, en partie noir, en partie testacé ; tête petite, noire, yeux peu grands ; antennes foncées à base testacée ; prothorax court, moins large que les élytres, retréci en avant, testacé à macules discales noires, irrégulièrement et densément ponctué par place ; écusson foncé ; élytres courts et larges, à épaules marquées, plus larges que le prothorax à la base, courtement et faiblement atténués à l'extrémité, fortement ponctués, testacés à suture foncée et dessins noirs suivants sur chaque élytre : trois traits allongés à la base, un interne plus court, un médian plus long, un huméral plus large, ensuite sur le milieu une macule commune suturale et trois traits ceux-ci accolés en dessus, les 2 externes parfois joints en arrière et dessinant ainsi une sorte de lunule, enfin, une courte fascie transversale ondulée placée avant le sommet ; dessous du corps foncé ; pattes flaves avec les cuisses obscurcies. Long. 2 mm. Ile Bourbon (coll. Pic). — Je classe provisoirement cette nouveauté dans le genre *Donaldia* All. ; elle diffère de *D. elegans* All., en plus du dessin élytral, par la tête plus étroite, le prothorax moins large, ces organes étant en outre peu brillants.

Chærocephalus tuniseus. — Oblong, assez large, un peu brillant, noir orné d'une pubescence fauve fine et peu serrée parsemée, sur les élytres, de macules faites d'une pubescence blanchâtre avec quelques soies foncées en partie soulevées, antennes roussâtres ; tête convexe, très densément ponctuée et finement réticulée, le vertex avec une impression profonde et allongée, sillonnée dans le fond, celle-ci placée entre les yeux, ces organes peu saillants ; rostre court et large, creusé au milieu et triangulairement impressionné au sommet ; antennes longues et grêles, roussâtres, le sommet du scape étant un peu rembruni, à articles 1 et 2 du funicule très longs, 3 et 4 courts, plus longs que larges, 5e subglobuleux, 6e et 7e peu transverses, massue longue ; prothorax court, un peu élargi vers le milieu, inégal en dessus avec quelques points espacés très gros ; élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, acuminés au sommet, à stries faibles ponctuées de points assez forts mais non carrés ; interstries non convexes ; pattes foncées, cuisses inermes. Long. 6 mill. Tunisie. Ain Draham (Pic). Voisin de *fallax* Desbr., impression frontale différente et tête à ponctuation uniforme, etc. ; différerait en outre de *lanosimanus* Chevr. (ex descript.) par l'aspect un peu brillant et la pubescence non continue des élytres. C'est la première espèce du genre décrite de Tunisie.

Callimus distinctipes. — ♂. Allongé, subparallèle, brillant, orné de poils gris espacés et en partie redressés, noir avec les élytres d'un vert métallique, les cuisses et l'abdomen testacés ; tête fortement et irrégulièrement ponctuée ; antennes noires, assez grêles; prothorax noir, plus long que large, un peu étranglé à la base, distinctement

élargi et subtuberculeux vers le milieu, orné de 3 callosités brillantes sur le disque, à ponctuation très forte et assez dense autour des callosités ; écusson noir, large ; élytres déprimés, peu larges, subparallèles, un peu déhiscents à l'extrémité et séparément subacuminés au sommet, à épaules peu marquées et arrondies, ponctuation forte, rapprochée et irrégulière ; pattes foncées avec les cuisses testacées ; dessous du corps foncé, sauf l'abdomen testacé. Long. 9 mill. Syrie : Bichfaya à 1200^{m} d'altitude (coll. Pic). — Espèce bien distincte par la coloration de ses élytres jointe à celle bicolore de ses pattes, à placer près de *akbesianus* Pic ; moins robuste que *semicyaneus* Pic avec les antennes non épaissies, les élytres différant de forme et coloration.

M. Pic.

DEUX NOUVEAUX COLEOPTÈRES D'ESPAGNE

Anthicus Manueli n. sp. Oblongus, satis latus, postice distincte attenuatus, nitidus, sericeo pubescens, niger, thorace pro parte, articulis primis antennarum pedibusque testaceis ; elytris nigris, antice testaceo maculatis et post medium testaceo fasciatis.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence soyeuse fine, élytres foncés à dessins testacés ; tête noire, large, presque plus large que le prothorax, distinctement et densément ponctuée, subtronquée en arrière ; antennes atteignant la base des élytres, robustes, foncées avec les 4 à 6 premiers articles testacés et minces, dernier article peu long ; prothorax assez court, distinctement et densément ponctué, fortement dilaté-arrondi en avant, plus ou moins foncé antérieurement et en dessus, variablement testacé sur les côtés ou en arrière ; élytres peu longs, assez larges, très diminués en arrière, à épaules très arrondies chez ♀, légèrement tuméfiés au sommet chez ♂, noirs avec sur chaque élytre une macule subtriangulaire externe et subhumérale, puis une large fascie postmédiane presque droite, celles-ci testacées ; pattes testacées. Long. 2,8-3 mm. Valencia (M. de la Escalera in coll. Pic. — De coloration rappelle *roseicollis* v. *semiroseus* Pic, mais la forme est plus atténuée en arrière, les pattes sont entièrement testacées, la ponctuation est un peu différente.

Gymnetron Fuentei n. sp. Latus et brevis, depressus, niger, griseo fulvo aut griseo pubescens et hirsutus ; rostro satis breve, fere recto, insubulato ; elytris late striatis.

Large et court, très déprimé en dessus sur les élytres, entièrement noir membres compris, revêtu d'une pubescence rude d'un gris flave ou grise, celle-ci en partie soulevée ; rostre assez court, presque droit, non subulé, pas sensiblement diminué au sommet, pubescent en arrière avec une ligne médiane dénudée, prothorax court et large, assez arrondi sur les côtés, diminué antérieurement, la pubescence ne formant pas de crête pileuse nette sur le milieu du disque ; écusson grand, pubescent ; élytres peu plus longs que larges, débordant un peu le prothorax à la base, séparément arrondis au sommet, à stries larges, et très marquées, les intervalles garnis de plusieurs rangs de poils assez régulièrement disposés ; extrémité de l'abdomen et pygidium revêtus de poils rudes serrés ; pattes foncées, robustes, cuisses non ou indistinctement dentées. Long 4 mm. Pozuelo (de la Fuente in coll. Fuente et Pic). — Espèce remarquable par sa forme large et courte jointe à son rostre assez court et cylindrique, pou-