

les cuisses et tibias étant au moins en partie noirs, tandis qu'ils sont roux avec les tarses seulement noirs chez *D. italicum* Kust.

**Oberia euphorbiæ v. nov. histrionis** Capite nigro, antice minute rufescente aut testaceo, thorace nigro, immaculato. Hongrie (coll. Pic). — Correspond à la var. *melitana* Reiche de *O. erythrocephala* Germ.

**Oberia erythrocephala v. nov. erivanica.** Satis robustus, parum elongatus, nitidus, rufus, antennis, oculis, elytris pectoreque pro parte nigris, elytris parum distincte pubescentibus, fortiter lineato-punctatis, Long. 12 mill. Arménie : Erivan (coll. Pic) — A placer près de *O. v. Theophilei* Pic, mais prothorax non bordé de noir et dessous du corps en majeure partie roux-testacé.

(A suivre.)

M. Pic.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite)

**Curtolyprops nov. gen.** Capite antice truncato, oculis mediocris ; antennis subfiliformibus, articulo 2° breve, 3° elongato, ultimo parum crasso ; thorace lateraliter sinuato et mediocre marginato ; elytris latis et brevibus, epipleuris antice valde dilatatis et impressis ; pedibus validis, articulo penultimo tarsarum valde dilatato et piloso ; prosterno lato ; coxis brevibus. — Diffère, à première vue, de *Lyprops* Hope, dont il est voisin, par la forme très large et courte des élytres.

**Curtolyprops latipennis n. sp.** Robustus, subopacus, glaber, niger. Capite antice late irregulariter impresso, postice dense punctato plicato ; thorace breve, postice attenuato, angulis anticis fere rectis, in disco irregulariter et multi impresso ; elytris latis et brevibus, apice attenuatis, convexis, irregulariter punctatis aut impressis. Long. 14 mill. Côte d'Ivoire (coll. Pic).

**Lyprops subopacus n. sp.** Latus, subopacus, minute fulvo pubescens, densissime punctatus, niger, elytris subnitidis.

Large, subopaque, orné d'une pubescence fauve couchée et rapprochée, très densément ponctué, les points larges, entourés de rides, noir avec les élytres un peu brillants. Tête à ponctuation moins large que celle du prothorax ; antennes courtes et robustes ; prothorax court, arrondi sur les côtés, un peu étranglé à la base ; élytres bien plus larges que le prothorax, courtement atténués au sommet, à épaules larges mais arrondies. Long. 13 mill. Sénégal (coll. Pic). — Espèce très distincte par sa ponctuation très dense, moins forte sur les élytres. Peut se placer près de *L. guineensis* Fm., ce dernier est plus brillant, a les élytres plus larges et plus courts, les antennes un peu plus longues.

**Lyprops subelongatus n. sp.** Oblongus, subdepressus, griseo sat sparse pubescens, nitidus, niger, elytris rufescentibus.

Oblong, peu convexe, brillant, orné d'une pubescence grise couchée, assez écartée, noir avec les élytres roussâtres. Tête à ponctuation forte, un peu écartée sur le ver-