

14. *Acalyptus caucasicus* nov. sp.

*Testaceus, parum convexus, pube fulvo-sericea nitida dense tectus, capite rarius subinfuscato, scutello obscuriore, meso- et metasternoque nigris.* — Long. 2,1 mill. (*sine rostro pallide ferrugineo*).

Dem *A. alpinus* ähnlich, aber einschliesslich des Rüssels und des Halssch. gelb gefärbt, auch der Bauch hell und nur die Mittel- und Hinterbrust, sowie die Augen schwarz.

Kaukasus (besonders bei Elisabetpol), dann Südrussland, an der Wolga. Meine zahlreichen Stücke aus dem Kaukasus stimmen alle überein.

15. *Clytus (Sphegestes) arietoides* nov. sp.

Der sibirische *Clytus arietis*, den Leder sehr zahlreich am Baikal-See gesammelt hatte, erweist sich als eine von diesem distincte Art. Während nämlich die Hinterschenkel beim ♂ und ♀ bei unserer Art die Deckenspitze weit überragen, erreichen sie bei der sibirischen, beim ♂ kaum, beim ♀ sind sie beträchtlich kürzer als die Deckenspitze<sup>1</sup>). Der Käfer ist ferner noch matter als unsere Art; die Fühler sind kürzer, gegen die Spitze allmählich schwach getrübt; die gelbe Basalbinde des Halssch. ist stets mehr weniger unterbrochen; die Basalmakel der Fld. ist kürzer, schräg gestellt, die Mittelbinde schräg und fast gerade, von der Stärke der queren hinter der Mitte, sie erreicht nicht die Naht und ist vorn weit vom Schildchen entfernt, ihr Hinterrand ist aufsen meistens rundlich ausgebuchtet, die Spitze ist nur schmal gelb gesäumt. — Long. 9,5—14 mill.

Ostsibirien, besonders am westlichen Ufer des Baikal-Sees.

Mit dieser Art scheint sehr nahe verwandt zu sein: *Cl. Mayeti* Thery, l'Echange 1892, 141 aus Sibirien, aber dieser ist nur 6 mill. lang und 1½ mill. breit, die Mittelbinde ist anders, weiter innen nach vorn reichend, und die Stirn soll ausgehöhlt und in der Mitte fein gekielt sein.

<sup>1</sup>) Bei *Cl. vesparum* m. aus demselben Verwandtschaftskreise überragen die Schenkel ebenfalls nicht die Spitze der Decken; dieser aber ist viel gröfser, Fühler und Beine hellgelb, die vordere Querbinde des Halssch. in der Mitte verbreitert, die vordere gelbe Querbinde der Decken stark nach vorn gebogen, und die hintere ist schief von innen nach aufsen gestellt.