

LIII. CALLEDIUM.

Palpi quatuor clavati. Maxilla membranacea bifida. Labium bifidum laciniis tenuissimis acutis. Antennae setaceae.

381. C. BAJULUS.

Long. 7. l. Lat. 3. l.

Thorace villoso tuberculis duobus, corpore fusco. *F. sp.*
236. 1.

Cerambyx Bajulus thorace mutico, subrotundo, villoso, tu-
berculis duobus, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat. 636.*
76. Fn. Sv. 672.

Geof. Ins. 1. 218. La Lepture brune à corcelet rhomboidale.

C. Caudatus. De Geer. Ins. 5. 86. 82.

Leptura Bajula Scop. Ent. Carn. 156. Schrank. E. I. 281.

Schaef. Elem. t. 76. f. 4. Icon. t. 64. f. 4. 5.

Totum nigricans, capite, & thorace praesertim villoso, tu-
berculis duobus lucidis atris. Elytra punctis prominulis
scabra. Femina caudata elytris pallidioribus. Variat ma-
gnitudine minori. *Linn. confer in Fn. Sv.*

Habitat in arborum truncis.

* 382. C. HOLOSERICEUM.

Long. 9. l. Lat. 3. $\frac{1}{4}$ l.

Thorace mutico rotundato globoso, corpore elytrisque cine-
reis holosericeis.

An *C. Sericeum F. Mant. 152. 14?*

Statura, & magnitudine proximum *C. Rustico*, sed totum
tomento cinereo obtectum. Differt etiam oculis magis lu-
nulatis, thorace punctis elevatis non concavis, femoribus
crassioribus. Pedes, antennaeque cinereae pilis adspersae.

Tab. I. f. 6.

Repertum pluries in horti pariete.