

256. CLAVIPES, Keulenschenflichter Bockkäfer.

Cerambyx thorace spinoso; niger, albo irroratus; femoribus omnibus, antennarumque articulo primo clavatis.

Le capricorne noir marbré de gris. *Geoffr. paris. part. 1. p. 204. sp. 7.*

<i>Mensurae.</i> Long. a cap. ad an.	5 lin.
elytri	$3\frac{1}{2}$ —
antennae	$6\frac{1}{2}$ —

Descr. Reipsa niger, sed per totum corpus albido cinere aspersus. Antennae nigro cinereoque variegatae, uti & femora. Primus antennarum articulus crassus, subglobosus, femora gracilia apice clavata, clava ovata.

Differt a Cerambyce variegato, cui simillimus, 1) clava antennarum baseos atra; 2) elytrorum nullis striis elevatis; 3) femoribus tenuibus apice clavatis, clava ovali:

Habitat in Oettscher monte, ubi sub initium Julii lectus.

257. MERIDIANUS, Mittagsbockkäfer.

Cerambyx meridianus, thorace subspinoso, elytris subfastigiatis, fuscis, antice testaceis, pectore nitente. Lin. S. N. gen. 204. sp. 47.

Lin. faun. suec. n. 648.

Zagdieb. Müll. Lin. Nat. Ch. V. p. 269.

<i>Mens.</i> Longit. thoracis	$1\frac{1}{2}$; in alio	$1\frac{2}{3}$ lin.
elytri	$4\frac{3}{4}$; —	$5\frac{1}{2}$ —
antennae	5 circiter;	7 —
Latitudo thoracis	1;	$1\frac{1}{3}$ —
elytrorum	$1\frac{2}{3}$;	2 —