

51. *LEPTURA PALLIDIPENNIS*, Tourn. *Ratcha*.

♂ Long. 12 millim., larg. 3 1/2 millim. ♀ Long. 13 millim. larg., 4 1/2 millim. Noire, avec les élytres d'un jaune ocre clair unicolore. Tête allongée, finement chagrinée, marquée, dans son milieu, d'un fin sillon longitudinal, à pubescence un peu longue, jaunâtre; antennes aussi longues que le corps chez le ♂, un peu plus longues que la moitié du corps chez la ♀. Prothorax un peu plus long qu'il n'est large à sa base, élargi de l'avant à l'arrière, rebordé antérieurement, bisinué postérieurement, à lobe médian large; bords latéraux faiblement arqués, sinués avant les angles antérieurs qui sont assez aigus; disque médiocrement convexe, marqué d'un sillon transverse près du bord antérieur et d'un au-dessus du bord postérieur; surface finement chagrinée, à pubescence longue, fine, jaunâtre. Scutellum presque glabre marqué de quelques points. Elytres presque de moitié plus larges aux épaules que la base du prothorax, régulièrement rétrécies de l'avant à l'arrière, tronquées un peu en biais à l'extrémité; assez fortement et assez densément ponctuées à leur racine; la ponctuation, qui est presque confluyente transversalement, s'affaiblit peu à peu à l'arrière et devient nulle à l'extrémité; surface parcimonieusement recouverte d'une pubescence fine, courte, couchée, d'un jaune doré. Dessous du corps assez densément recouvert d'une pubescence soyeuse, d'un gris jaunâtre; cinquième segment abdominal du ♂ simplement échancré à son extrémité et marqué, sur toute sa longueur, d'une large et profonde dépression longitudinale.

Rapports et différences. — Cette espèce a tout à fait la forme de la *L. tesserula* Charp., après laquelle elle doit se placer. Le ♂, cependant, est un peu plus allongé, les antennes sont plus longues; elle en diffère encore par une ponctuation plus fine, plus serrée surtout sur les

élytres, par la couleur de ses téguments qui n'offrent aucune tache; elle a également des affinités avec la *L. fulva* de Geer, mais s'en distingue facilement par sa forme. Chez notre *L. pallidipennis* ♂, le 5^e segment abdominal est simplement échancré à son extrémité, tandis que chez la *L. fulva* de G., les côtés de l'extrémité de ce même segment sont prolongés en une sorte de pointe frangée.

52. *LEPTURA FULVA* de Geer. Var. minor. *Persath*.53. *LEPTURA DISTINCTA*, Tourn. *Persath*.

♂ Long. 13 millim., larg. 3 1/2 millim. ♀ inconnue. Corps allongé; noir, avec une tache roussâtre sur chaque élytre. Tête finement chagrinée, marquée d'une dépression transverse un peu au-dessus de l'insertion des antennes et d'un faible sillon longitudinal; pubescence peu visible, jaunâtre; antennes atteignant environ les 3/4 postérieurs de la longueur du corps, un peu comprimées et un peu épaissies à partir du 5^e article. Prothorax d'un tiers environ plus long qu'il n'est large à sa base, faiblement échancré à son bord antérieur, bisinué et rebordé au bord postérieur, à lobe médian large; disque densément et finement chagriné, offrant antérieurement et postérieurement un faible sillon transversal et sur son milieu une très-faible trace d'une ligne longitudinale glabre; surface à pubescence assez longue, jaunâtre. Scutellum glabre, marqué de quelques points. Elytres d'un tiers environ plus larges aux épaules que la base du prothorax, médiocrement et régulièrement rétrécies de l'avant à l'arrière, tronquées un peu en biais à leur extrémité; surface assez fortement, mais peu densément ponctuée à la racine et le long de la suture, plus finement sur la partie postérieure, avec une pubescence courte, couchée, noirâtre; la couleur foncière de ses organes est noire; antérieurement et sur chaque élytre près de leur racine, entre l'angle humé-