

144. MOLORCHUS MARMOTTANI. — *Piceus, pubescens; elytris, thorace brevioribus, testaceis; lateribus apiceque brunneis; antennis pedibusque brunneo-ferrugineis, thorace subgloboso.* — Long. 5 1/3 millim.

Tête un peu plus étroite que le corselet, couleur de poix, couverte de gros points enfoncés, rapprochés; ces points, entre les yeux, sont plus distants; un large sillon entre les antennes. Yeux noirâtres, très-échancrés. Antennes sétacées atteignant les deux tiers des cuisses postérieures, d'un brun-ferrugineux; deuxième article, près de trois fois plus petit que le troisième. Corselet couleur de poix, un peu plus long que large, creusé légèrement près du sommet, et profondément au-dessus de la base, d'un sillon transversal; arrondi sur les côtés, subitement et fortement rétréci vers sa base; surface couverte de gros points enfoncés, rapprochés, avec un tubercule allongé brillant et lisse, sur la partie postérieure de sa ligne médiane, et de chaque côté, un peu en avant, avec un calus lisse et brillant. Elytres à peine plus larges que le corselet, mais distinctement plus courte que lui; épaules saillantes, avec une longue fossette humérale; arrondies à l'angle extérieur, et plus encore à l'angle sutural; surface couverte d'assez gros points enfoncés, peu profonds et peu serrés; d'un brun ferrugineux sur les côtés et vers la partie inférieure, testacées sur la partie du disque rapprochée de la suture. Pieds allongés, grêles, d'un brun ferrugineux; cuisses

rétrécies en un long pédicule à la base, brusquement renflées vers le sommet. Mâle inconnu.

Cette espèce s'éloigne de l'*umbellatorum* par sa taille moindre, son corselet plus court, plus fortement arrondi sur les côtés, et ses élytres beaucoup plus courtes.

Trouvé au Canigou, par M. le docteur Marmottan.