

vers : il est revêtu, ainsi que la tête, d'un duvet brun roussâtre droit et assez serré. Écusson triangulaire, ponctué et velu. Élytres un peu plus larges que le corselet, y compris les épines latérales de celui-ci, légèrement rétrécies au-dessous de l'angle huméral, assez étroites, un peu bombées, faiblement échancrées à l'extrémité, couvertes de points enfoncés très-serrés et plus gros à la base et sur les parties latérales : elles sont d'un rouge de sang, avec une bande noire assez large, commune aux deux élytres, commençant au tiers de leur longueur, ne couvrant que la moitié des élytres, puis s'élargissant à l'extrémité jusqu'au bord extérieur et terminal, après avoir envoyé un petit prolongement dirigé en haut dans la partie rouge de l'élytre. Dessous du corps et pattes finement ponctués, noirs et un peu velus.

*Hab.* Dans les bois aux environs de Carithène, en Juin; rare.

475 PURPURICENUS DESFONTAINII Fabr. (*Cerambyx*) Syst. Eleuth. II, p. 274, n.° 37. — Oliv. (*Cerambyx*) Coléopt. IV, 67, p. 128, n.° 174, pl. 23, fig. 183.

*Hab.* Nous n'avons pas trouvé cette espèce en Morée; mais nous savons qu'elle y a été prise.

476 CERAMBYX MILES Bonel. *ined.*? — Niger; thorace transverse valde rugoso; elytris coriaceis; antennarum baseos articulis apice nodosis; caeterum *C. heros* esset Fabricii. — Long. 40 millim., lat. 12.

DESCR. Cette espèce ressemble beaucoup au *C. heros*, Fabr.; le principal et pour mieux dire le seul caractère que nous lui connaissions, c'est d'avoir les premiers articles des antennes forts et noueux à l'extrémité; on peut remarquer aussi que les rugosités transversales du corselet sont plus fortes.

*Hab.* Nous avons trouvé cette espèce sur un très-beau chêne au pied de la montagne sur laquelle est situé le château de Colocotroni à Carithène.

*Obs.* Cet insecte a reçu trois noms différents, mais nous ne connaissons aucun ouvrage où il soit décrit. On le voit dans les collections sous le nom de *C. nodulosus*, Germ. Serait-il décrit dans quelqu'un des ouvrages de cet auteur? Bonelli l'a appelé *C. miles*; est-ce un nom inédit? Il porte encore celui de *C. Welensii*, Meg., mais ce nom ne se trouve guère répandu.

477 CERAMBYX VELUTINUS Dej. *ined.* — Ater, sericeo subtiliter villosus; tibiis infra tarsisque rufescentibus; thorace crasse rugoso, dente laterali crasso, producto; elytris latis, subparallelis. — Long. 43 millim., lat. 12.

DESCR. C'est avec le *C. heros* que cette espèce a le plus de rapports : elle est proportionnellement plus large; les antennes sont grêles comme dans le *C. heros*, et finement velues, avec les articles de l'extrémité un peu plus étroits et plus allongés;

les tubercules latéraux du corselet sont plus gros, le dernier plus avancé; sa surface, au lieu d'être couverte de rugosités transversales, est parcourue par des élévations irrégulières et plus grossières, laissant voir une ligne médiane lisse et un peu élevée; deux fortes impressions la traversent dans sa largeur en avant et en arrière. Écusson bilobé. Élytres larges, légèrement renflées, très-peu rétrécies vers l'extrémité, très-finement rugueuses sur toute leur surface et surmontées de trois côtes longitudinales peu élevées, dont l'intérieure est courte et s'arrête à la suture au tiers antérieur de la longueur des élytres. La tête, le corselet, l'écusson et les élytres sont garnis, ainsi que les antennes, d'un court duvet d'un soyeux grisâtre et serré. Le dessous du corps en est même un peu plus fortement garni, ainsi que les pattes; le milieu des cuisses postérieures, les jambes et les tarses sont revêtus de poils plus longs et roux.

*Hab.* Aux environs de Marathonisi dans le golfe de Laconie à la fin de Juin.

478 CERAMBYX HEROS Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 270, n.° 21. — Oliv. Coléopt. IV, 67, p. 12, n.° 9, pl. 1, fig. 1.

*Hab.* En Juin, aux environs de Carithène.

479 CERTALLUM RUFICOLLE Fabr. (*Callidium*) Syst. Eleuth. II, p. 334, n.° 2. — Oliv. (*Callidium*) Coléopt. IV, 70, p. 19, n.° 22, pl. 2, fig. 27.

*Hab.* Sur les fleurs en Juin. Peu commun.

480 CLYTUS BOBELAYEI Br. — Obscure castaneus, punctatus; capite anterieus flavo-hirto; thorace fasciis 2 transversis; elytris fasciis 2 et maculis 4 flavis; scutello cinerascens; corpore subtus albicante villosus; antennis, tibiis tarsisque flavescentibus. — Long. 18 millim., lat. 7. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 12.)

DESCR. Tête finement chagrinée, noirâtre, marquée d'un petit trait longitudinal en avant et couvert à cette même partie de poils couchés, jaunâtres; palpes d'un brun foncé; antennes légèrement velues, fauves, avec le premier article brun. Corselet globuleux, tronqué en avant et en arrière, assez fortement ponctué, d'un brun noirâtre, avec deux bandes de poils jaunes dans toute sa largeur, lesquelles se réunissent de chaque côté, et des poils de même couleur le long du bord postérieur. Écusson arrondi, un peu plus large que long, garni de poils couchés, grisâtres et serrés, avec une ligne longitudinale lisse à son milieu. Élytres plus larges que le corselet, un peu étranglées au-dessous de l'angle de la base, diminuant insensiblement de largeur jusqu'à l'extrémité, où elles sont arrondies et forment avec la suture un petit angle rentrant : leur surface est finement chagrinée et surmontée d'une ou deux côtes longitudinales très-faibles : leur couleur est un brun foncé, orné d'un reflet soyeux dû à un duvet très-court : sur chaque élytre