

- Elytra apice rotundata.
24. P. thorace marginato crenato albo bilineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *bilineatus.*
 Habitat in America Dom. v. Rohr.
 Affinis praecedenti, a quo tamen differt thoracis dorso lineis duabus albis, elytris atomis albis irroratis apice subspinosis.
25. P. thorace marginato crenato, capite submandibulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis. *spinibarbis.*
 Cerambyx spinibarbis. Linn. Syst. nat. 2. 624. 4.
 Mus. Lud. Ulr. 67.
 Merian Surinam. 24. tab. 24.
 Habitat in America meridionali.
 Mandibulae magnae, crassae, intus tridentatae, apiceque emarginatae.
26. P. thoracis lateribus scabris multidentatis: dente palmato, antennis brevibus. *palmatus.*
 posteriori palmato, antennis brevibus.
 Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.
 Statura & magnitudo P. spinibarbis. Caput canaliculatum, nigrum. Antennae breves, compressae, obscure piceae. Thoracis dorsum planum, laeve, nitidum, lateribus scabris: margine multidentato; dente tertio ante apicem majori, palmato. Elytra laevia, picea, ad suturam apice mucronata. Pedes intus ferrati.
27. P. thorace marginato crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *maxillofus.*
 Prionus maxillofus. Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 3.
 Cerambyx maxillofus. Drury Inf. 1. tab. 38. fig. 3.
 Habitat in America Mus. Britann.
 Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Mandibulae porrectae, acutae, intus hirsutae,