

CALLIDIUM. *Palpi* quatuor clauati.
Maxilla membranacea,
 bifida.
Labium bifidum: laci-
 niis tenuissimis.
Antennae fetaceae.

- 9—10. *C.* thorace pubescente nigrum punctatum *punctatum*.
 femoribus rubris, antennis mediocribus.
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.
 Statura sequentium at omnino distinctum. Tho-
 race elytrisque utrinque punctatis.
- 15—6. *C.* thorace glabro subspinoso nigrum ely- *hungari-*
 tris obscure aeneis. *cum*.
Callidium hungaricum Herbst. Arch. tab. 26.
 fig. 12.
 Habitat in Germania Dom. Hybner.
 Statura omnino *C.* variabilis at duplo maior.
 Antennae mediocres, nigrae. Thorax pla-
 nus, laevis, utrinque subspinosus. Elytra
 subrugosa, obscure aenea. Corpus nigrum
 femoribus clauatis.
- 17—8. *C.* thorace elytrisque cinereo villosis, an- *concolor*.
 tennarum articulis basi scutelloque niueis.
 Habitat — — —
 Medium. Antennae vix corporis longitudine
 testaceae articulis basi niueis. Caput, thorax,
 elytra punctata cinereo villosa, immaculata.
 Corpus et pedes concolora.
- 18—9. *C.* thorace subtuberculato nigrum elytris *variolosum*.
 variolosis: sutura acuminata.