

*DICHOSTATES SUBOCELLATUS.* — Long. 20 mill. — *Sat brevis, robustus, fusco-brunneus, indumento pubescente dense vestitus, squalide griseo-cinerascens, lineis obscuris rufulo maculosis vage vittulatus, elytris basi utrinque penicillo brevi rufulo et disco medio macula grisea vage determinata, postice macula rufulo-velutina limitata signatis; capite summo obscuriore, vittis 3 fuscis, lateralibus paulo elevatis, mediana sulcata; antennis corpore haud longioribus, subtus pilosis, articulo 1° fusco valde maculato, 3° supra obscuro, sequentibus apice interdum paulo infuscatis; prothorace transverso, elytris angustiore, inæquali, lateribus postice utrinque dente sat valido munito, dorso antice transversim impresso et plicato, postice medio longitudinaliter carinulato, rufulo vage mixto, fusco antice bisignato et postice trisignato, et punctis fuscis sparsuto; scutello lato, subtruncato; elytris ad humeros sat fortiter angulatis, postice leviter attenuatis, apice obtuse rotundatis, basi intus grosse sed parum distincte punctatis, humeris paulo granulatis, lineis aut potius venulis parum elevatis, extus evidentioribus et longius prolongatis; subtus densissime albido-pubescentis, cum pedibus fusco punctatis, segmentis ventralibus apice dense rufulo fimbriatis, ultimo late impresso et sat longe fulvo-piloso, basi medio spatio minuto denudato et foveola minuta signato; tarsis latis, paulo obscuris.*

Ce *Dichostates* est d'une forme large et trapue qui rappelle celle de certains *Coptops*; ses élytres présentent à la base une petite houpette de poils veloutés roussâtres, autour de laquelle on voit une teinte veloutée de même coloration; au milieu de chaque élytre il y a une tache blanchâtre, mal limitée et bordée en arrière par une petite tache, souvent peu distincte, de poils veloutés roussâtres; cette teinte se retrouve plus pâle, en macules, sur des espèces de nervures peu régulières, plus marquées en dehors, presque effacées vers la suture, qui est un peu relevée.

*POGONOCHERUS CRISTULATUS.* — Long. 6 1/2 mill. — *Oblongus, fuscus, dense pubescens, brunneo et griseo-albido variegatus; capite valde reclinato, antice griseo, inter oculos transversim bi-infuscato, summo medio plaga magna brunnea; antennis sat gracilibus, corpore paulo longioribus, subtus dense villosis, griseis, articulis apice fuscis, 1° crasso, basi et apice obscuro; prothorace subquadrato, elytris angustiore, lateribus medio obtuse angulato, dorso griseo et brunneo vario, inæquali, fere medio tuberculo oblongo, fusco signato, basi transversim paulo depresso, griseo, medio striolis 2 fuscis brevissimis; scutello lato, obtuse rotundato; elytris basi truncatis, ad humeros angulatis, a basi leviter attenuatis, apice sepa-*