

ciliato, angulo, externo acutiusculo; pectore lateribus albomarginato, segmentis abdominalibus 3 primis apice albido-sericeis, pedibus piceis.

Pékin.

Ressemble beaucoup au *massiliensis*, mais plus allongé, avec la tête moins large, le corselet plus ovalaire, non globuleux, non rugueux, les antennes bien plus grêles et plus longues, la bande médiane des élytres bien transversale, l'extrémité tronquée moins obliquement avec une bande bien transversale, et les segments abdominaux plus largement blanchâtres.

Clytus polyzonus.

Long., 12 à 13 mill. — Oblongus, sat convexus, fuscus, pube flava et rufula densa variegatus, capite flavo, carina media, medio fissa, et linea basali angusta denudatis, mandibulis et ore rufiflavis, antennis parum gracilibus, medium corporis vix attingentibus flavo-rufis; prothorace pube sulphurea vestito, vitta media longitudinali postice utrinque recurva, sed marginem posticum haud attingente denudata; scutello sulphureo; elytris basi rufulis, medio flavis, apice flavo-fumatis, vittis 4 denudatis transversim ornatis, 1^a minore arcuata suturam haud attingente, 2^o fortiter arcuata, partem rufam limitante, 3^a fere media latiore, parum arcuata, 4^o ante apicem, extus postice prolongata, apice truncato, extus acute dentato; subtus dense sulphureo-pubescens, pectore medio et segmentis abdominalibus basi medioque denudatis, pedibus sat gracilibus, flavo-rufis, femoribus 4 posticis apice fuscis, tarsis posterioribus articulo 1^o cæteris conjunctis æquali.

Environs de Pékin.

Ressemble assez au *C. variabilis* Motsch., mais bien distinct par les élytres tronquées à l'extrémité, avec l'angle externe épineux, les dessins du corselet qui, au lieu d'être transversaux, forment une espèce d'ancre et la première bande des élytres très courte, fortement arquée, la dernière beaucoup moins rapprochée de l'extrémité.

Clytus artemisiæ.

Long., 8 à 10 mill. — Species inter *C. massiliensem* et *C. plebejum* intermedia, a primo statura paulo robustiore, prothorace