

5. **Lasiopezus rufodorsatus**, n. sp. — Long. 16 mill. — Oblongus, fuscus, sed pube variegata dense vestitus, griseo-cinereus, punctis et maculis fuscis sparsutus, capite summo vitta brevi transversa obtusissime angulata nigro-velutina; elytris dorso plaga media communi rufa, extus angulata et pallido marginata signatis, postice et lateralibus signaturis nigris ornatis; capite valde reclinato, medio sulcato; antennis corpore parum longioribus, ciliatis, articulis 3 primis fuscis, pallido punctatis, ceteris piceolo et brunneo marmoratis, apice pallidis, articulo 1° crasso, extus apice granuloso; prothorace elytris angustiore, transversim quadrato, lateribus medio angulatim dilatatis, crenatis, dente apice obtusiusculo, dorso antice et postice transversim bisulcato et lateribus utrinque biemarginato, disco medio tuberculo obtuso notato et arcuatim plicatulo; scutello late et obtuse triangulari; elytris ad humeros angulatis et paulo productis, basi sat acute granulatis, grosse punctatis et utrinque crista dense nigro-penicillata, extus cristula minuta comitata signatis, parte rufa æquali, dimidia parte postica carinulis penicillatis et tuberculis fuscis, ante apicem macula rufa sat minuta signatis, apice rotundatis, angulo suturali dentiformi; subtus cum pedibus griseo-pubescentibus, brunneo-punctatis, his latius fusco maculatis ♀.

Ressemble assez à *Ancylonotus tribulus*, mais la taille est bien plus faible, le premier article des antennes est bien plus court, plus épais, avec l'extrémité garnie de granulations au lieu de cicatrice; le dessous des antennes est un peu cilié; le corselet est dilaté au milieu des côtés en une saillie crénelée avec l'extrémité un peu obtuse; la sculpture des élytres est assez semblable, mais l'extrémité est arrondie en dessous avec l'angle sutural saillant; les pattes sont plus courtes, égales, les fémurs plus épaissis au milieu, et les derniers segments abdominaux sont de longueur égale. Les mandibules sont courtes. La coloration, la forme de l'écusson, celle des épaules, des crêtes basilaires et la terminaison des élytres distingueront facilement cette espèce de *L. marmoratus* Fabr.

6. **Dichostathes Coquereli**, n. sp. — Long. 9 mill. — Oblongus, modice convexus, postice leviter attenuatus, fuscus, pube albido-grisea dense vestitus, elytris apice paulo obscurioribus; capite medio subtiliter striato, oculis angustis fere bipartitis; antennis corpore longioribus, ciliatis, articulis apice paulo brunneis, 3° quarto longiore, ceteris gradatim decrescentibus; prothorace elytris angustiore, transverso, lateribus

medio dente late conico armatis, dorso antice et basi transversim depresso et sulcato, disco medio dente valde obtuso infuscalo signato, utrinque obtusissime bituberoso; scutello brevi, obtuse truncato; elytris ad humeros angulatis, paulatim postice attenuatis, apice separatim rotundatis, dorso subtiliter punctatis et obsolete transversim impressiusculis, basi utrinque tuberculo brunneo compressiusculo ornatis, medio signaturis et punctis subtilibus brunneis sparsutis; subtus uniformis, pedibus validiusculis, tibiis 4 posticis extus vitta fusco-pubescente ornatis. — Massouah (Coquerel).

Voisin de *D. strigifrons* Fairm., qui se trouve aussi à Obock, mais plus petit, couvert d'une pubescence plus grise et plus uniforme, avec la tête sans lignes dénudées, les yeux plus rapprochés en dessous, plus petits en dessus, le corselet ayant les dents latérales plus larges et plus coniques, et situées plus au milieu, l'écusson beaucoup plus court, les élytres atténués après le milieu, tronqués bien plus obliquement.

7. **Belodera densevestita**, n. sp. — Long. 9 à 13 mill. — Elongata, convexa, fusca, pilis fulvo-cervinis adpressis omnino densissime vestita; capite summo brunneo breviter bilineato, inter antennis concavo; antennis corpore paulo longioribus, subtiliter ciliatis, articulo 1° sat crasso, tertio vix brevior, 3-11 subæqualibus, apice obsolete obscuratis; prothorace longitudine vix latiore, antice et basi æquilato, lateribus medio denticulo minuto signato, dorso medio transversim leviter convexo, antice leviter depresso, granulis minutissimis sparsuto; scutello apice rotundato, medio leviter sulcatulo; elytris elongatis, basi truncatis, ad humeros sat angulatis, postice attenuatis, apice oblique truncatis, angulo suturali late rotundato, externo sat acuto, dorso sat grosse et sat dense punctatis, leviter inæqualibus; segmento ventrali ultimo profunde ac triangulariter excavato. — Obock (D<sup>r</sup> Faurot), coll. Bedel.

Se trouve aussi à Guélidi (Somalis). L'individu de cette dernière localité est plus petit et d'une coloration plus roussâtre.

Cet Insecte s'éloigne un peu de ses congénères par son corps robuste, assez épais et recouvert d'une pubescence extrêmement serrée, cachant complètement la couleur du fond, et presque uniforme, étant seulement un peu plus claire sur le disque du corselet et formant sur les élytres des taches extrêmement indistinctes, paraissant très légèrement impressionnées.