

.694) *CALLIDIUM (Clytus) TEMESIENSE Kollari*: thorace globoso, flavo-fasciato, hirtum, piceum, antennis pedibusque fulvis, elytris puncto pone basin fasciisque tribus flavis, prima antrorsum arcuata. Habitat in Transsylvania.

Parvum, *C. gazella* duplo fere minus et angustius, magis hirtum. Caput nigrum, fronte flavo-pubescente. Antennae fulvae. Thorax globosus, punctato-rugosus, piceus, albido-hirtus, margine antico posticoque flavis. Scutellum flavum. Elytra angusta, punctata, pilis nigris setosa, basi albido-hirta, apice subtruncata; picea: macula obliqua pone basin, fascia media pone futuram antrorsum curvata, scutellum haud attingente, altera recta infra medium apiceque flavis. Pectus piceum, flavescenti-hirtum, pleuris et striga laterali flavis. Abdomen piceum, segmentis margine flavis. Pedes fulvi, femoribus posterioribus ante apicem obscurioribus.

.695) *NECYPALIS FEMORATUS Steveni*: elytris integris, apice angustatis, hirtus, niger, abdomine rufo, femoribus basi fulvis, apice inflatis nigris. Habitat in Rossia meridionali.

*N.* rufo duplo minor. Caput punctatum, hirtum, atrum, labro testaceo. Antennae pilosae, nigrae. Thorax transversus, basi apiceque coarctatus, dorso impressus, tricallosus, hirtus,

hirtus, niger. Elytra abdominis longitudine, apice angustiora, punctata, nigra. Corpus subtus hirtum, nigrum, abdomine rufo. Pedes nigri, femoribus apice inflatis, basi fulvis.

.696) *LEPTURA CONSTRICTA*: thorace spinoso, basi apiceque constricto, punctata, atra, elytris convexis, oblongis, (maris) flavo-maculatis apice rotundatis, aut (feminae) immaculatis, apice truncatis. Habitat in Sibiria.

Statura *L. interrogationis*, sed paullo major. Caput punctato-rugosum, atrum, opacum, antennis corpore brevioribus, nigris. Thorax oblongus, basi apiceque constrictus, lateribus medio spinosus, dorso gibbus, canaliculatus, totus ater, opacus, griseo subpubescens, confertim punctatus. Coleoptera thorace duplo fere latiora, apice parum angustiora, convexa, confertim punctata, maris macula obliqua humerali, arcu medio et fascia ante apicem testaceis variegata, apice obtuse rotundata, feminae tota atra, apice truncata. Corpus subtus cum pedibus nigrum, griseo-sericeum.

.697) *LEPTURA INSITIVA Böberi*: thorace subspinoso, nigra, femoribus ferrugineis, elytris fastigiatis, testaceis: vitta laterali futuraque fuscis, apice oblique truncatis. Habitat in Russia meridionali.

Statura fere *L. attenuatae*. Caput magnum, punctatum, pubescens, nigrum, palpis flavis. Anten-